

Nervpåverkan i samband med behandling med oxaliplatin

Cytostatikabiverkningar från nerver kan göra att du känner domningar, stickningar eller brännande känsla i huden. Andra symtom kan vara smärta i händer och fötter eller försämrad finmotorik, exempelvis svårigheter att knäppa knappar. Du kan också få svårt att gå.

Kontakta oss om du upplever nya eller förvärrade symtom på perifer neuropati. Det kan vara bra att fylla i skattningsskalan inför varje behandling. Följ instruktionerna du får av din läkare eller sjuksköterska.

Skattningsskala för bedömning av symtom

	Nej, inte alls	Ja, lite	Ja, en del	Ja, mycket	Om ja, hur många dagar efter föregående kur? ≤ 7 dagar, > 7 dagar
Jag har övergående domningar eller stickningar i händerna om jag utsätter mig för kyla					
Jag har övergående domningar eller stickningar i fötterna om jag utsätter mig för kyla					
Jag har svårt att knäppa knappar eller har svårt att känna formen på små föremål. jag är fumlig i händerna					
Jag har svårt att gå, svårt med balansen					
Jag har smärtsamma stickningar i händer och eller fötter efter behandlingen					
Jag har alltid övergående domningar eller stickningar i händerna om jag utsätter mig för kyla under hela perioden mellan behandlingarna					Fyll inte i här

[Patientinformation - utskriftsvänlig](#)