

## Uro Sorafenib (Nexavar) p.o.

**Kurintervall:** Kontinuerlig behandling.

**Indikation:** Njurcellscancer och HCC

### Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings-tillfälle, mg	Antal administrerings-tillfällen/dygn	Dygns dos	Adm
A	Sorafenib	400	2	800	per oralt

### Övrigt

- Perukremiss övervägs
- Remiss till sjukhustandvården i samband med start av behandling.
- [Provtagning rutinmässig](#)
- Blodtryck 1 ggr/ vecka i 6 veckor. Sjuksköterska skriver remiss till primärvården
- Läkemedelsinteraktioner, se [FASS](#)
- [Att förebygga och behandla hand-fotsyndrom](#). Läkare ska skriva recept på mjukgörande (t.ex. Propyderm)

### Dosreduktion

- Biverkningmonitorering, [checklista](#)
- När dosreduktion är nödvändig skall dosen minskas med 50 % (dvs till två tabletter á 200 mg en gång dagligen).

### Patientinformation

- [Patientinformation Sorafenib \(Nexavar\)\(obs sarkom\)](#)

### Start

	Att göra	Var ordinerat
1.	Informera patient om behandlingen.  Provförpackning, recept, biverkningar, provtagning och uppföljning. Hur sköter patienten läkemedelsbehandling	
2.	Dela tablettorna i dosett eller enligt överenskommelse med	Medicinskt tumörbehandlingskort

	patienten	
--	-----------	--

### Uppföljning

	Att göra via sköterskebesök eller telefonkontakt	Var ordinerat
1.	Tablettbehandling, compliance (följsamhet till behandling)  Planera återbesök vid behov	
2.	Skicka med tabletter från läkemedelsförråd på mottagningen, för 2 veckors förbrukning. Sen tar de prover efter 1 vecka och tox.kontroll med sjuksköterska via telefon. Efter ytterligare en vecka, tas nya prover inför besök till sjuksköterska. Ge tabletter för 2 veckors behandling. Sen är det vanligen läkarbesök och då ska läkare skriva recept.	Medicinskt tumörbehandlingskort
3.	Om patienten avbryter behandlingen - be henne/honom att ta med resterande läkemedel tillbaka (enligt rutiner för kliniska prövningar)	

### Anmärkningar

- Tabletterna delas i dosett inför första behandlingstillfället för 1 månads förbrukning
- Tabletterna ska tas på fastande mage eller tillsammans med fettsnål måltid
- Information; uppmärksam på hand - fot syndrom och huvudvärk (blodtrycksstegring)