

Maligt melanom, Temozolomid

Cytodose: "Maligt melanom Temozolamid 150mg/m² STARTBEH 28d" och "Maligt melanom Temozolamid 200mg/m² U-HÅLLSBEH 28d". Kurlängd 28 dagar

Indikation Maligt melanom

Startbehandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings-tillfälle, mg/m ²	Antal administrerings-tillfällen/dygn	Doser/cykel	Adm	Dag
A	Temozolomid (Temomedac)	150	1	5	p.o.	1-5

	Substans/dag	1	2	3	4	5	Dag 6-28	Dag 29 se underhållsbehandling nedan
A	Temozolomid	A	A	A	A	A	-	

Underhållsbehandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings-tillfälle, mg/m ²	Antal administrerings-tillfällen/dygn	Doser/cykel	Adm	Dag
A	Temozolomid	200	1	5	p.o.	1-5

	Substans/dag	1	2	3	4	5	Dag 6-28	Dag 29 ny cykel
A	Temozolomid	A	A	A	A	A	-	

Övrigt

- Doseskalera till 200 mg/m² (underhållsbehandling) om ingen hematologisk toxicitet efter "startbehandling"
- Alla doser avrundas uppåt till tillgänglig kapselstyrka (max 10 mg upp per dygn) Kapselstyrkor: 20 mg, 100 mg, 140 mg, 180 mg, 250 mg.
- Antiemetika: Ondansetron 1 timme före intag av Temozolamid
- Dosnivåer: 200 mg/m²/dygn, 150 mg/m²/dygn, 100 mg/m²/dygn och behandlingen avbryts om behov finns av dosreduktion under 100 mg/m²/dygn
- [Provtagning rutinmässig](#) Blodstatus+neutrofila dag 21.

Dosreduktion

Substans	Neutrofila	TPK
	< 1,5	<100
Temozolomid	Behandlingen uppskjutes	Behandlingen uppskjutes

Patientinformation

Körschema Temozolomid

	Att göra	Var ordinerat
1	Dela kapslarna i dosett (eller säkerställ på annat sätt att patienten har tillgång till Temozolomid i rätt mängder). Ge patienten medicinlistan från Cytodose	Cytodose
2	Se till att patienten har tillgång till Ondansetron samt Primperan Uppmana patienten att ta antiemetika ca 1 timme före Temomedac kapslarna Temomedac tas på fastande mage på morgonen med ett glas vatten. 1 timme före måltid Sköterskebesök inför varje kur. Dosettdelning eller ge patienten hela förpackningar.	Recept Cosmic