

Bröst Capecitabin 1000 mg/m² 21 d

Cytodose = "Bröst Capecitabin 1000mg/m² 21 d" Cykellängd (kurintervall) 21 dagar

Indikation

Bröstcancer. Adjuvant och palliativ behandling.

Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings-tillfälle, mg/m ²	Antal administrerings-tillfällen/dygn	Doser/cykel/kur	Adm	Dag
A	Capecitabin (Xeloda)	1000 (dvs. 2000 mg/m ² per dygn)	2	28	p.o.	1-14

Substans/dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Paus dag 15-21	Dag 22 ny cykel/kur
A Capecitabin	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		

Övrigt

- Testa för DPYD-brist innan preparatet ges.
- Om patienten har få eller inga biverkningar kan dygnsdosen ökas till 2500 mg/m².
- EKG vid anamnes på hjärtsjukdom
- [Att förebygga och behandla Hand- fotsyndromet](#)
- Uppföljning med avseende på hand-fot syndrom och övrigt enligt NCIC-gradering via telefon med sjuksköterska dag 8 serie 1, samt vid varje besök.
- [Provtagning, rutinmässig](#)
- [Antiemetika vid behov](#)

Dosreduktion icke-hematologisk toxicitet enligt NCIC -gradering

Substans	1:a gången	2:a gången	3:e gången	4:e gången
Grad I	Fortsätt behandlingen	Fortsätt behandlingen	Fortsätt behandlingen	Fortsätt behandlingen
Grad II	Återuppta (fulldos) vid tox 0-1	Återuppta (75 % av fulldos) vid tox 0-1	Återuppta (50 % av fulldos) vid tox 0-1	Avsluta behandlingen
Grad III	Återuppta (75 % av fulldos) vid tox 0-1	Återuppta (50 % av fulldos) vid tox 0-1	Avsluta behandlingen	
Grad IV	Avsluta behandlingen			

[Biverkningar - gradering av toxicitet i samband med behandling med capecitabine](#)

Dosreduktion hematologi

Substans	Neutrofila	TPK
----------	------------	-----

	< 1,5*	<100*
Capecitabin	Paus i en vecka. Nästa behandling 75 % av fulldos	Paus i en vecka. Nästa behandling 75 % av fulldos

*OBS, vid adjuvant behandling bör en samlad bedömning göras om rimligt att ändå ge behandling trots hematologisk toxicitet.

[Patientinformation](#)

Körschema dag 1-14

	Att göra	Var ordinerat
1.	Skriv ut medicinlista från ELAS	
2.	Lämna tabletter och medicinlistan till patienten Informera patienten om att han/hon skall svälja capecitabin hela tillsammans med måltid eller inom 30 minuter efter avslutad måltid, samt att ta doserna med ca 12 timmars intervall.	Cytodose

Anmärkningar

Provtagning och telefonkontakt med patienten dag 8 i cykel nr 1, därefter vid behov.