

Bröst Trastuzumab emtansin (Kadcyla) 21 d

Cytodose: "Bröst Kadcyla 3,6 mg/kg (Trastuzumab-emtansin) 21 d" "Bröst Kadcyla dosred. 3,0 mg/kg (Trastuzumab-emtansin) 21 d" "Bröst Kadcyla dosred. 2,4 mg/kg (Trastuzumab-emtansin) 21 d" Kurintervall 21 dagar

Indikation: Bröstcancer HER2 positiv

Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings-tillfälle	Antal administrerings-tillfällen/dygn	Doser/cykel/kur	Adm	Dag
A	Trastuzumab-Emtansin (Kadcyla)	3,6 mg/kg	1	1	i.v.	1

	Substans/dag	1	Dag 2-21 Behandlingsuppehåll	Dag 22 ny cykel/kur
A	Trastuzumab-Emtansin (Kadcyla)	A	-	

Övrigt

- [Antiemetika vid behov](#)
- Infusionstiden är default satt till 90 minuter. Ändra manuellt i Cytodose till 30 minuter från kur 2 förutsatt att patienten inte reagerat.
- UKG före behandling. Vid adjuvant behandling beställs UKG var 3:e månad. Vid palliativ behandling 1 gång/år eller vid symtom.
- Patienter med förhöjt ALAT före första behandling (t ex pga levermetastas) är ev. predisponerade för leverskada
- Ej studerat för patienter med serumtransaminaser > 2,5 x normalvärde samt totalbilirubin > 1,5 x normalvärde. Avbryt om transaminaser > 3 x normalvärde och bilirubin > 2 x normalvärde
- OBS! Pneumonit, levertoxicitet, vänsterkammardysfunktion
- OBS! Om patienten har reagerat på trastuzumab ska premedicinering ges.
- Dosreduktion: Första till 3 mg/kg, andra till 2,4 mg/kg (finns mallar i cytodose)
- Avrunda till rimliga doser, dosjustering nedåt med max 20 mg och uppåt med max 10 mg (100 mg samt 160 mg ampuller finns).
- Om en patient missar en planerad dos bör den administreras så snart som möjligt, utan att invänta nästa planerade behandlingscykel. Doserings-schemat ska justeras för att bibehålla ett intervall på 3 veckor mellan doser.
- Trastuzumab emtansin-dosen ska inte ökas igen efter att en dosreduktion gjorts.
- [Provtagning](#)

Dosreduktion - hematologi

Substans	Neutrofila	TPK
	< 1.0	<75
Trastuzumab-	Behandlingsuppehåll, diskutera med	Se

emtansin	bröstkolog innan ny dos	FASS
----------	-------------------------	----------------------

Dosreduktion

Dosreduktion vid förhöjda transaminaser eller bilirubin samt TPK- se tabell i [FASS](#)

Patientinformation

Körschema

	Att göra	Infusionstid	Var ordinerat
1	Akutvagn tillgänglig		-
2	Sätt spoldropp 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml för spolning före och efter		
4	Ge Trastuzumab emtansin (Kadcyla) spädd i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml som intravenös infusion Patienten ska stanna kvar för observation 1 timme efter avslutad behandling, vid första behandlingstillfället	90 minuter (1:a gången) därefter 30 minuter	Cytodose