

GI Sorafenib (Nexavar) p.o.

Cykellängd: Kontinuerlig behandling

Indikation: Njurcellscancer och HCC

Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings- tillfälle, mg	Antal administrerings- tillfällen/dygn	Dygns dos	Adm
A	Sorafenib	400	2	800	per oralt

Övrigt

- Perukremiss övervägs
- Remiss till sjukhustandvården i samband med start av behandling.
- Provtagning rutinmässig
- Sjuksköterska kontrollerar prover och kontaktar läkare vid avvikande provsvar (rödmarkerat i BoS eller enligt journaltext). Patienten får ingen bekräftelse på proverna så länge de är normala. Vid minsta tveksamhet ska sjuksköterska kontakta läkare; 1. PAL, 2. Cytordinatör, 3 Dagjour.
- Blodtryck 1 ggr/ vecka i 6 veckor. Sjuksköterska skriver remiss till primärvården
- Läkemedelsinteraktioner, se FASS
- Att förebygga och behandla hand-fotsyndrom. Läkare ska skriva recept på mjukgörande (t.ex. Propyderm)

Dosreduktion

- Biverkningmonitorering, checklista
- När dosreduktion är nödvändig skall dosen minskas med 50 % (d.v.s. till två tabletter á 200 mg en gång dagligen).

Patientinformation

Patientinformation Sorafenib (Nexavar)

Start Sorafenib (Nexavar), urogenital

	Att göra	Var ordinerat
1.	Informera patient om behandlingen. Provförpackning, recept, biverkningar, provtagning och	

	uppföljning. Hur sköter patienten läkemedelsbehandling Checklista	
2.	Dela tabletterna i dosett eller enligt överenskommelse med patienten	Medicinskt tumörbehandlingskort

Uppföljning Sorafenib (Nexavar), urogenital

	Att göra via sköterskebesök eller telefonkontakt	Var ordinerat
1.	Tablettbehandling, compliance (följsamhet till behandling) Planera återbesök vid behov Checklista	
2.	Skicka med tabletter från läkemedelsförråd på mottagningen, för 2 veckors förbrukning. Sen tar de prover efter 1 vecka och tox.kontroll med sjuksköterska via telefon. Efter ytterligare en vecka, tas nya prover inför besök till sjuksköterska. Ge tabletter för 2 veckors behandling. Sen är det vanligen läkarbesök och då ska läkare skriva recept.	Medicinskt tumörbehandlingskort
3.	Om patienten avbryter behandlingen - be henne/honom att ta med resterande läkemedel tillbaka (enligt rutiner för kliniska prövningar)	

Anmärkningar

- Tabletterna delas i dosett inför första behandlingstillfället för 1 månads förbrukning
- Tabletterna ska tas på fastande mage eller tillsammans med fettsnål måltid
- Information; uppmärksam på hand - fot syndrom och huvudvärk (blodtrycksstegring)