

Uro Enzalutamid (Xtandi) p.o.

Kurintervall: 28 dagar

Indikation: Prostatacancer; hormonkänslig metastaserad(mHSPC) eller kastrationsresistent metastaserad (mCRPC)

Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings- tillfälle (totaldos)	Antal administrerings- tillfällen/dygn	Doser/cykel	Adm	Dag
A	Enzalutamid	160 mg	1	28	p.o	1-28

	Substans/d ag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Dag2 9 ny cykel
A	Enzalutamid	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	

Villkor för start av regimen

Kontroll av Hb, LPK, TPK, Na, K, Ca, kreatinin, ASAT, ALAT.

Enzalutamid är en potent enzyminducerare som kan ge effektminskning för många vanliga läkemedel, se FASS. En genomgång av läkemedel som kan ges samtidigt bör därför göras innan behandlingsstart.

Skrivs på recept.

Villkor och kontroller för administration

Missad dos - ta den förskrivna dosen så nära den vanliga tiden som möjligt. Vid missad dos under en hel dag, återuppta behandlingen nästa dag.

Enzalutamid Per oral tablett

Dosering i förhållande till måltid: Tas med eller utan mat vid ungefär samma tidpunkt varje dag

Anvisningar för ordination

Om baslinjeprover normala: Hb, LPK, TPK, , ASAT, ALAT 1 gång/månad de första 3 månaderna, därefter var 3:e månad. PSA 1 gång/månad. Testosteron inför utvärderingsbesök.

Blodtrycksmätning inför behandling och sedan var 3:e månad. Patienten kan ta blodtryck på vårdcentralen alt. med egen blodtrycksmätare i hemmet. Be patienten höra av sig till kontaktsjuksköterska om blodtrycket överskrider 160/100 mmHg.

Den basala kastrationsbehandlingen ska behållas under behandlingen.

Dosreduktion rekommendation

Vid biverkningar = grad 3 eller en icke tolererbar biverkning, gör uppehåll i en vecka eller tills symtomen förbättrats till = grad 2. Återuppta med samma dos eller en lägre dos (120 mg eller 80 mg), se FASS.

[Patientinformation](#)