

Bröst EC 75 (Epirubicin/Cyklofosfamid) 21 d

Cytodose= "Bröst EC 21 d" Kurintervall: 21 dagar

Indikation: adjuvant

Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings-tillfälle m ²	Antal administrerings-tillfällen/dygn	Doser/cykel/kur	Adm	Dag
A	Epirubicin (Farmorubicin)	75	1	1	i.v.	1
B	Cyklofosfamid (Sendoxan)	600	1	1	i.v.	1

	Substans/dag	1	Paus dag 2-21	Dag 22 ny cykel/kur
A	Epirubicin	A		
B	Cyklofosfamid	B		

Övrigt

- [Antiemetika: högemetogent](#) (Akynto delas ut av sjuksköterska, ej på recept)
- Inför adjuvant antracyclinbehandling ska en kardiovaskulär riskbedömning göras, se lokala riktlinjer bröstcancer.
- Ackumulerad dos epirubicin=max 900mg/m
- Dosreduktion vid nedsatt leverfunktion
- [Provtagning, rutinmässig](#)

Dosreduktion

Substans	Neutrofila	Neutrofila	TPK	TPK
	≥ 1,0	< 1,0	≥ 100	<100
Epirubicin	100 %	Behandlingen uppskjutes	100 %	Behandlingen uppskjutes
Cyklofosfamid	100 %	Behandlingen uppskjutes	100 %	Behandlingen uppskjutes

[Patientinformation](#)

[Högemetogent](#)

Körschema

Att göra	Infusionstid	Var ordinerat
Kontrollera att patienten har tagit antiemetika		
Sätt spoldropp 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml för spolning före och efter respektive läkemedel		-

Ge Epirubicin spädd i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml som intravenös infusion	30 minuter	Cytodose
Ge Cyklofosfamid spädd i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml som intravenös infusion	20 minuter	Cytodose