

GI Gemcitabin 28 d

Kurintervall 28 dagar

Indikation: GI: Pancreascancer - adjuvant, samt vid inoperabel eller metastaserad sjukdom, gallvägscancer, gallblåsecancer.

Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings-tillfälle, mg/m ²	Antal administrerings-tillfällen/dygn	Doser/cykel/kur	Adm	Dag
A	Gemcitabin	1000	1	3	i.v.	1,8,15

	Substans/dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-28	Dag 29 ny cykel/kur
A	Gemcitabin	A	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	A	-	

Övrigt

- **Dag 8 och 15 skjuts ej upp. Om man inte kan ge dag 8 hoppar man över, och fortsätter behandling dag 15. Om dag 15 ej kan ges väntar man med att starta ny cykel dag 1 (enl kur, efter 2 planerade pausveckor).**
- Ordinerar T. Betapred 16 tabletter (8 mg) inför behandling (för att förebygga influensaliknande symtom)
- [Antiemetika lågemetogen](#)
- [Provtagning, rutinmässig](#)
- Dosreduktion hematologi - adjuvant behandling

Substans	Neutrofila	Neutrofila	TPK	TPK
	<0,5	0,5-0,9	<50	50-99
Gemcitabin	Behandlingen uppskjutes (eller hoppas över - se ovan)	50-75 % av fulldos	Behandlingen uppskjutes (eller hoppas över - se ovan)	50-75 % av fulldos

Dosreduktion hematologi - palliativ behandling

Substans	Neutrofila	TPK
	<1,5	<75
Gemcitabin	Behandlingen uppskjutes (eller hoppas över - se ovan)	Behandlingen uppskjutes (eller hoppas över - se ovan)

Patientinformation**Gemcitabin (förebygg) influensaliknande symtom****Körschema**

	Att göra	Infusionstid	Var ordinerat
1	Kontrollera att patienten tagit Betapredtabletter		Cytodose
2	Sätt spoldropp 250 ml Natriumklorid för spolning före och efter respektive läkemedel		
3	Ge Gemcitabin spädd i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml som intravenös infusion	30 minuter	Cytodose