

Uro Cabazitaxel 21 d

Cytodose: Cabazitaxel 21 d"

Kurintervall: 21 dagar

Indikation: Prostatacancer, metastaserad

Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings-tillfälle, mg/m ²	Antal administrerings-tillfällen/dygn	Doser/cykel/kur	Adm	Dag
A	Cabazitaxel (Jevtana)	20*	1	1	i.v.	1

	Substans/dag	1	Dag 2-21 behandlingsuppehåll	Dag 22 ny cykel/kur
A	Cabazitaxel	A	-	

Övrigt

- Allergiprofilax ingår i kuren: T. Desloratadin 5 mg 2 st + T. Betapred 0,5 mg 16 st
- [Antiemetika lågemetogen](#)
- Ordinera Prednisolon 10 mg 1x1 kontinuerligt
- Ge 6-10 kurer
- Utvärdering efter 4 kurer
- G-CSF kan övervägas istället för dosreduktion vid isolerad neutropeni
- Samordna behandlingarna till samma dagar om fler än 1 patient behandlas samtidigt. Detta minskar kassationen.
- NYTT 220807: skicka remiss BRCA-analys tumörvävnad om patienten bedöms sannolikt lämplig för olaparib nästkommande linje
- [Provtagning](#)

Dosreduktion - hematologi

Substans	Neutrofila	TPK
	< 1,50	<100
Cabazitaxel	Behandlingen uppskjutes i 1 vecka	Behandlingen uppskjutes i 1 vecka

Dosreduktion - diarréer

- Vid uttalade eller persisterande diarréer görs behandlingsuppehålls tills symtomfrihet, därefter dosreduktion.

Patientinformation[Patientinformation Cabazitaxel](#)

- [Allergiprofylax](#)

Körschema

Att göra	Infusionstid	Var ordinerat
Ge eller kontrollera att patienten tagit allergiprofylax T. Desloratadin 5 mg 2 tabletter + T. Betapred 8 mg 1-3 timmar innan Cabazitaxel		Cytodose
Akutvagn tillgänglig		
Blodtryckskontroll före behandlingsstart och övervak av patienten de två första behandlingarna		
Sätt spoldropp 250 ml Natriumklorid för spolning före och efter respektive läkemedel		
Ge Cabazitaxel spädd i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml som intravenös infusion	60 minuter	