

GI Teysuno-Oxaliplatin (SOX) 21 d

Kurintervall: 21 dagar

Cytodose: "GI Teysuno-Oxaliplatin 21d"

Indikation: Esofagus, ventrikel och kolorektalcancer

Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings-tillfälle, mg/m ²	Antal administrerings-tillfällen/dygn	Doser/cykel/kur	Adm	Dag
A	S1 (Teysono)	25	2	28	p.o.	1-14
B	Oxaliplatin	130	1	1		

	Substans/dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Paus dag 15*-21	Dag 22 ny cykel/kur
A	S1 (Teysono)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	
B	Oxaliplatin	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Övrigt

- Antiemetika medelemetogen
- Profylax mot IRR (infusionsrelaterad reaktion): 1 g paracetamol + 10 mg desloratadin ca en timme före start av behandling
- Inför kur 4 och varje efterföljande kur ska sjuksköterska ringa patienten före ordination och efterhöra neuropatier. Dokumenteras i journalen. Nedan finns skattningsskala till hjälp.
- Perifer neuropati - i samband med behandling med oxaliplatin
- Vid anamnes på hjärtsjukdom, ta EKG före behandling.
- Försiktighet vid nedsatt njurfunktion. Om estimerat GFR 30-49 ml/minut så reducera med 5 mg/m² eller överväg alternativ/likvärdig regim, se FASS.
- Provtagning, rutinmässig

Dosreduktion icke-hematologisk toxicitet enligt NCIC -gradering

Substans	1:a gången	2:a gången	3:e gången	4:e gången
Grad I	Fortsätt behandlingen	Fortsätt behandlingen	Fortsätt behandlingen	Fortsätt behandlingen
Grad II	Gör uppehåll och återuppta (fulldos) vid	Gör uppehåll och återuppta (75 % av	Gör uppehåll och återuppta (50 % av	Avsluta

	tox grad 0-I	fulldos) vid tox 0-I	fulldos) vid tox 0-I	behandlingen
Grad III	Gör uppehåll och återuppta (75 % av fulldos) vid tox 0-I	Gör uppehåll och återuppta (50 % av fulldos) vid tox 0-I	Avsluta behandlingen	
Grad IV	Avsluta behandlingen			
Biverkningar		Duration av biverkningar		Bestående biverkningar mellan behandlingarn
		1-7 dagar	> 7 dagar	
Dyestesier med köldkänsla		Ingen dosändring	Ingen dosändring	Ingen dosändring
Parestesier		Ingen dosändring	Ingen dosändring	Behandlingen avbryts
Parestesier med smärta		Ingen dosändring	1:a gång: sänk dos 25 % 2:a gång: sänk dos 25 % 3:e gång: Avbryt	Behandlingen avbryts
Parestesier med funktionsnedsättning		Ingen dosändring	1:a gång: sänk dos 50 % 2:a gång: Avbryt	

Dosreduktion hematologi

Neutrofila	TPK	Teysono	
> 1,5	>75	100 %	
1,1 - 1,5	50 - 75	75 %	
≤ 1,0	< 50	Behandlingen uppskjutes en vecka. Överväg dosreduktion vid nästa kur.	

Patientinformation

Antiemetikaschema: Medelemetogen och allergiprofylax

[Patientinformation SOX](#)

Körschema

	Att göra	Infusionstid	Var ordinerat
1	Kontrollera att patienten tagit antiemetika och IRR-profylax (infusionsrelaterad reaktion profylax)		Cytodos
2	Akutvagn tillgänglig		
3	Sätt spoldropp 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml		

4	Ge Oxaliplatin spädd i 500 ml Glukos 50 mg/ml intravenöst	2 timmar	Cytodos
5	Skriv ut medicinlista från Cytodos web		Cytodos
6	Lämna kapslar och medicinlistan till patienten. Kapslarna intas morgon och kväll minst 1 timme före eller 1 timme efter måltid. OBS, de ska inte tas i samband med måltid.		Cytodos

Anmärkningar

Telefonkontakt med kontakt med sjuksköterska dag 8 i kur 1

Akut neuropati, vid svåra symtom - förläng infusionstiden till 2-6 timmar.