

Uro Enfortumab vedotin (Padcev) 28 d

Cytodose: "Uro Enfortumab Vedotin- DAG 1, 8, 15 28 d"

Kurintervall: 28 dagar

Indikation: Urotelialcancer

Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings-tillfälle mg	Antal administrerings-tillfällen/dygn	Doser/cykel	Adm	Dag
A	Enfortumab Vedotin (Padcev)	1,25 mg/kg	1	3	i.v.	1,8,15

Substans/dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-28	Dag 29 ny kur
A Enfortumab Vedotin (Padcev)	A	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	A	-	

Övrigt

- [Antiemetika lågemetogen](#)
- Förpackningsstorlekar 20 mg, 30 mg
- Pga ny kur med osäker emetogen risk – Ssk tel inför dag 8 och 15 i kur 1 för att värdera antiemetikabehov
- För att undvika kassation: apoteket avvaktar beredning trots att preparatet är ordinerat – sjuksköterska ringer när patienten är på plats och bedömd.
- Vid hudtoxicitet bör PAL/uroteam tillfrågas. Var uppmärksam på sår i slemhinnor (i munnen, halsen och i underlivet)
- Perifer neuropati mycket vanligt: Perifier neuropati - monitorering
- Vid infusionsreaktion som tex feber, frossa eller värk bör Paracetamol 1000 mg och Desloratadin 5 mg ges. Detta kan också övervägas att ges som premedicinering inför behandlingar därefter.
- [Provtagning](#)

Biverkningar

Grad I	Symtomatisk behandling
Grad II	Uppehåll med behandling. Steroid behandling motsvarande Prednisolon 1-2 mg/kg per dag. Reduceras när biverkningar är grad I minst 4 veckors steroidbehandling
Grad III- IV	Behandlingen utsättes permanent. Metylprednisolon i.v. 125 mg dag 1, därefter Prednisolon 1-2 mg/kg per dag p.o. Om ej svar på prednisolon ge Infiximab (Remicade) 5 mg/kg x 1

Biverkningar ska rapporteras som Events of Clinical Interest och SAE.

Dosreduktion

Substans	Neutrofila	TPK
	< 1,0	< 100
Enfortumab vedotin	Behandlingen uppskjutes	Behandlingen uppskjutes

Enligt FASS är dosreduktioner ner till 40 % ok. Dvs 0,5 mg/kg.

[Patientinformation Enfortumab](#)

[Patientkort](#) (ska lämnas till patienten)

[Antiemetikaschema lågemetogen](#)

Körschema

Att göra	Infusionstid	Var ordinerat
1 Sätt spoldropp 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml för spolning före och efter respektive preparat		-
2 Akutvagn tillgänglig		
3 Ge Enfortumab Vedotin spädd i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	30 min	Cytodose

- Pga ny kur med osäker emetogen risk – Ssk tel inför dag 8 och 15 i kur 1 för att värdera antiemetikabehov