

Uro Axitinib 28d

Cytodose="Axitinib."

Kurintervall: 28 dagar

Indikation: Njurcancer

Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings-tillfälle, mg	Antal administrerings-tillfällen/dygn	Doser/cykel	Adm	Dag
A	Axitinib	5 (startdos)	2	kontinuerlig	p.o.	

	Substans/dag	Dag 1-28	Dag 29 ny cykel
A	Axitinib	B	

Behandlingen pågår tills patienten progredierar eller får biverkningar som kräver utsättning

Övrigt

- Startdos med 5 mg x 2. Vid frånvaro av biverkningar av grad 3 och 4 under de första två veckornas behandling samt ett blodtryck (behandlat eller obehandlat) under 150/90 mm Hg, kan dosen ökas till 7 mg x 2 efter två kurer (6 veckor). Om denna dos tolereras väl enligt samma premisser kan dosen ökas till 10 mg x 2. Vi måttligt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh B) sänks startdos till 2 mg x 2.
- Axitinib skrivs på recept
- Axitinib kan ge högt blodtryck som kan uppkomma fort. Vid ev. dosreduktion eller utsättning var vaksam på hypotoni.
- Observans på GI – och hudbiverkningar.
- Grapefrukt och johannesört får ej intas under behandlingen.

Provtagning

Villkor för start av regimen

Blodstatus +Diff, elektrolytstatus, leverstatus, TSH, T4 fritt

EKG, Blodtryck

Urinsticka (proteinuri)

[Patientinformation](#)

Körschema

Axitinib tas dagligen morgon och kväll ungefär vid samma tidpunkt med eller utan mat

Cos
mic