

Uro Apalutamid (Erleada)

Cykellängd 28 dagar

Indikation

Prostatacancer; metastaserad hormonkänslig(mHSPC) och icke-metastaserad kastraktionsresistent (nmCRPC)

Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings-tillfälle (totaldos)	Antal administrerings-tillfällen/dygn	Doser/cykel	Adm	Dag
A	Apalutamid (Erleada)	240 mg (4 tabletter a 60 mg)	1	28	p.o	1-28

	Substans/dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Dag 29 ny cykel
A	Apalutamid (Erleada)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	

Övrigt:

- **Provtagning:**
Inför start: Kontroll av Hb, LPK, TPK, Na, K, Ca, kreatinin, ASAT, ALAT.
En gång i månaden, de tre första månaderna, därefter var 3:e månad: Hb, LPK, TPK, ALAT. PSA 1 gång/månad. Testosteron inför utvärderingsbesök.
- Dosering i förhållande till måltid: Tas med eller utan mat vid ungefär samma tidpunkt varje dag
- Risk för fosterskador under behandling och i 3 månader efter

Dosreduktion rekommendation

Vid biverkningar = grad 3 eller icke tolererbar biverkning, gör uppehåll i en vecka eller tills symtomen förbättrats = grad 2. Återta samma dos eller lägre dos (180mg eller 120 mg), se FASS.

Biverkningar

- Hjärttoxicitet: Ischemisk hjärtsjukdom (inkluderande kärlkramp, instabil angina och hjärtinfarkt) förekommer. Se över riskfaktorer som hypertoni, diabetes och dyslipidemi och optimera behandlingen av dessa. Förlängt QT-intervall
- Hypertoni förekommer.
- CNS påverkan: Ischemiska cerebrovasculära sjukdomar (inkluderande TIA och hjärninfarkt) förekommer. Se över riskfaktorer som hypertoni, diabetes och dyslipidemi och optimera behandlingen av dessa. Smakförändringar förekommer. Kramphändelser har rapporterats.
- Hyperkolesterolemi och hypertriglyceridemia vanligt.
- Hypothyreos förekommer.
- Hudtoxicitet: Hudutslag vanligt, Klåda och håravfall förekommer.
- Gastrointestinal: Nedsatt aptit och diarre vanligt.
- Fall och frakturer vanligt. Muskelspasm förekommer.
- Fatigue/trötthet vanligt.

Interaktionsbenägen substans

Vid samtidig administrering av stark CYP2C8-hämmare eller stark CYP3A4-hämmare med Apalutamid behövs ingen initial dosjustering, men en minskning av Apalutamid dos skall övervägas baserat på tolerabilitet, se FASS.

[Patientinformation](#)**Körschema**

Att göra		Var ordinerat
Recept		Cosmic