

GI FLOT 14 d

Kurintervall: 14 dagar

Indikation: Magsäckscancer

Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings-tillfälle mg/m ²	Antal administrerings-tillfällen/dygn	Doser/cykel/kur	Adm	Dag
A	Docetaxel	50	1	1	i.v.	1
B	Oxaliplatin	85	1	1	i.v.	1
C	Kalciumfolinat	200	1	1	i.v.	1
D	Fluorouracil (5-FU) via homepump	2600	- (Infusionstid ca 24 timmar)	1	i.v.	1-2
E	Pegfilgrastim	6 mg	1	1	s.c.	3

	Substans/dag	1	2	Paus dag 3-14	Dag 15 ny cykel/kur
A	Docetaxel	A	-	-	
B	Oxaliplatin	B	-	-	
C	Kalciumfolinat	C	-	-	
D	Fluorouracil	D	D	-	

Övrigt

- Testa för DPYD-brist innan behandling ges.
- Allergiprofylax i samband med Docetaxel: Premedicinering med kortison motsvarande tablett Betametason:
Behandlingsdagen: 1 tim före behandling tas Betapred 16 tabletter = 8 mg.
Dagen efter behandling; På morgonen tas Betapred 8 tabletter = 4 mg.
- Antiemetika, medelemetogen
- Profylax mot IRR (infusionsrelaterad reaktion) av oxaliplatin: 1 g paracetamol + 10 Desloratadin ca en timme före behandling.
- G-CSF ingår i regimen. Ordinerar i Cosmic. Delas ut av sjuksköterska, ej på recept.
- Inför kur 4 och varje efterföljande kur ska sjuksköterska ringa patienten före ordination och efterhöra neuropatier. Dokumenteras i journalen. Nedan finns skattningsskala till hjälp.
- [Perifer neuropati - i samband med behandling med oxaliplatin](#)
- [Provtagning, rutinmässig](#)

Dosreduktion icke-hematologisk toxicitet enligt NCIC -gradering (dosreducera Docetaxel i första hand)

Substans	1:a gången	2:a gången	3:e gången	4:e gången
Grad I	Fortsätt behandlingen	Fortsätt behandlingen	Fortsätt behandlingen	Fortsätt

				behandlingen
Grad II	Gör uppehåll och återuppta (fulldos) vid tox grad 0-I	Gör uppehåll och återuppta (75 % av fulldos) vid tox 0-I	Gör uppehåll och återuppta (50 % av fulldos) vid tox 0-I	Avsluta behandlingen
Grad III	Gör uppehåll och återuppta (75 % av fulldos) vid tox 0-I	Gör uppehåll och återuppta (50 % av fulldos) vid tox 0-I	Avsluta behandlingen	
Grad IV	Avsluta behandlingen			

[Biverkningar - gradering av toxicitet i samband med behandling av fluorouracil](#)

Dosreduktion hematologi

Neutrofila	TPK	Docetaxel	Fluorouracil *	Oxaliplatin	Calciumfolinat
≥ 1,5	≥100	100 %	100 %	100 %	100 %
	75-99**	75 %	50-75 % *	75 %	Samma % som 5-Fu
< 1,5**	<75**	Behandlingen uppskjutes 3-7 dagar. Överväg dosreduktion vid nästa kur. I neoadjuvant situation ska dosreduktion ske i samråd med GI- specialist			

* Överväg att utesluta bolusdosen helt istället för att dosreducera alla fluorouracildoser

** Vid neoadjuvant/adjuvant intention, överväg att ge behandling vid neutrofila >1,0 och/eller TPK <100. Ev. dosreduktion eller tillägg av G-CSF bör diskuteras med GI-specialist.

Dosreduktion neuropati (dosreducera Oxaliplatin i första hand)

Biverkningar	Duration av biverkningar		Bestående biverkningar mellan behandlingarna
	1-7 dagar	> 7 dagar	
Dyestesier med köldkänsla	Ingen dosändring	Ingen dosändring	Ingen dosändring
Parestesier	Ingen dosändring	Ingen dosändring	Behandlingen avbryts
Parestesier med smärta	Ingen dosändring	1:a gång: sänk dos 25 % 2:a gång: sänk dos 25 % 3:e gång: Avbryt	Behandlingen avbryts
Parestesier med funktionsnedsättning	Ingen dosändring	1:a gång: sänk dos 50 % 2:a gång: Avbryt	Behandlingen avbryts

- [Patientinformation FLOT](#)
- [Allergi och antiemetikaprofylax](#)

- [Homepump vid cytostatikainfusion](#)

Körschema

	Att göra	Infusionstid	Var ordinerat
1	Kontrollera att patienten tagit antiemetika och allergiprofylax		Cytodos
2	Akutvagn tillgänglig		
3	Sätt spoldropp 500 ml natriumklorid 9 mg/ml för spolning före och efter respektive läkemedel		
4	Ge Docetaxel spädd i 250 ml natriumklorid 9 mg/ml	1 timme	Cytodos
5-6	Ge Oxaliplatin spädd i 500 ml Glukos 50mg/ml samtidigt som Kalciumfolinat	1 timme*	Cytodos
5-6	Ge Kalciumfolinat spädd i 500 ml Glukos 50 mg/ml samtidigt som Oxaliplatin	1 timme*	Cytodos
7	Sätt homepump med Fluorouracil intravenöst	ca 24 timmar	Cytodos
8	Lämna ut pegfilgrastim		Cosmic

*Ges parallellt i samma infart

Anmärkningar

- Oxaliplatinet kan vid biverkningar ges på 2 timmar istället för 1 timme