

Malignt melanom Tebentafusp dag 1, 8, 15 21 d

Cytodose: "Malignt melanom Tebentafusp 20 µg kur 1 dag 1/ 30 µg kur 1 dag 8/ 68 µg"

Kurlängd: 21 dagar

Indikation: Ögonmelanom metastaserat första eller andra linje

Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings-tillfälle, mg/kg	Antal administrerings-tillfällen/dygn	Doser/cykel	Adm	Dag
A	Tebentafusp	20 µg kur 1 dag 1 30 µg kur 1 dag 8 68 µg kur 1 dag 15 + alla efterföljande doser	1	3	i.v.	1, 8, 15

	Substans/dag	1	8	15	Dag 22 ny kur
A	Tebentafusp	A	A	A	

Övrigt

- Tocilizumab ska finnas tillgängligt.
- Apoteket har inte detta i lager. Faxe beställning i god tid. Dyrt preparat. Sjuksköterska ringer beredningen när patienten är på plats och bedömd och först då bereds det.
- Kur 1 dag 1, 8, 15 kräver 16 timmar observation och ges ineliggande pga CRC-risk. Symtom kan inkludera feber, hypotension, hypoxi, frossa, illamående, kräkning, utslag, förhöjda levervärden, fatigue och huvudvärk. Majoriteten av CRC händelser startar samma dag som infusionen ges.
- Ingen premedicinering krävs rutinmässigt. Premedicinering med kortikosteroider ska ges om infusionsreaktion eller CRC inträffar.
- Prehydrering ingår i regimen. Överväg att kryssa blodtryckssänkande mediciner kur 1 dag 1, 8, 15.
- Om CRS grad 2 inte inträffar under kur 1 kan behandlingen från och med kur 2 ges polikliniskt med övervakningstid på 60 minuter och från och med kur 5 30 minuter.
- [PM Lund](#)
- Dosreduceras ej. Vid biverkningar ska behandlingen pausas eller sättas ut, se [FASS](#)
- [Provtagning](#)

[Patientinformation startdoser](#), [Patientinformation underhållsbehandling](#)
Körschema kur 1 dag 1, 8, 15 (ges ineliggande)

Att göra	Infusionstid	Var ordinerat
1 Akutvagn tillgänglig. Läkare ska finnas tillgänglig under infusionen och under observationstiden. Patienten ska ha 2 infarter (2 pvk eller 1 pvk + 1 central infart)		-
2 Ge prehydrering 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	2 timmar	Cytodose
3 Sätt spoldropp 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml		
4 Tag NEWS innan behandlingsstart. Observera patienten under infusionen och 2 timmar efter avslutad infusion		
5 Ge Tebentafusp spädd i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	20 minuter	Cytodose
6 Tag NEWS efter avslutad behandling samt var 30:e minut i två timmar. Därefter NEWS x 6 i 16 timmar		

Körschema från och med kur 2 om ingen infusionsreaktion inträffat (polikliniskt)

Att göra	Infusionstid	Var ordinerat
1 Akutvagn tillgänglig. Läkare ska finnas tillgänglig under infusionen och under observationstiden		-
2 Ge prehydrering 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	2 timmar	Cytodose
3 Sätt spoldropp 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml		
4 Tag NEWS innan behandlingsstart		
5 Ge Tebentafusp spädd i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	20 minuter	Cytodose
6 Patienten ska stanna kvar på observation 60 minuter efter avslutad behandling. Från och med kur 5 krävs inga kontroller och endast observationstid på 30 minuter efter avslutad behandling		