

CT Dränage, röntgen Ryhov

Patienten ska ha en sängplats på Ryhov för förberedelser och eftervård.

Förberedelser

- Alla smycken som finns i undersökningsområdet ska vara bortplockat.
- PVK ska vara satt och patienten ska vara sjukhusklädd och komma till röntgen i säng.
- Fastande 4 timmar före undersökningen.
- Dagsfärskt PK-INR och TPK ska finnas.
- PK-INR 1,5 eller lägre, trombocyter över 100. Om proverna avviker ska läkare konsulteras och man får diskutera åtgärd innan patienten kommer till röntgen.
- NOAK-preparat och trombocythämmare ska vara utsatta enligt rutin.
- Vid trombosprofylax med LMWH ska patienten inte erhålla det på morgonen.
- Ange eventuellt tolkbehov, se separat dokument.
 - Tolkbehov inför röntgenundersökning.
- Om patienten inte kan ligga still på grund av oro eller smärta ska premedicinering administreras på avdelning inför ingreppet.

Hur går en undersökning till

- Undersökningen utförs i buk-, sido- eller ryggläge.
- Patienten ska kunna ligga i den position, t.ex. bukläge, som röntgen har meddelat. Viktigt att detta har testats innan undersökningen.
- Patienten ska kunna ligga stilla under undersökningen, cirka 60 minuter.
- Patienten ska kunna medverka till och följa instruktioner.
- Lokalbedövning ges.
- Området steriltvättas.

Eftervård

- Patienten ska observeras och kontrolleras fastande sängliggande på vårdavdelning enligt eftervårdsblankett (1 – 4 timmar).
- Dränaget lämnas vanligtvis öppet från CT.