

Gyn Gemcitabin – Karboplatin (AUC4)

Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings- tillfälle, mg/m ²	Antal administrerings- tillfällen/dygn	Doser/cykel/kur	Adm	Dag
A	Gemcitabin (Gemzar)	1000	1	2	i.v.	1,8
B	Karboplatin (Paraplatin)	AUC=4*	1	1	i.v.	1

* Calverts formel $Dos (mg) = (planerad\ AUC) \times (GFR\ ml/min + 25)$

	Substans/dag	1	2	3	4	5	6	7	8	Paus dag 9-21	Dag 22 ny cykel/kur
A	Gemcitabin	A	-	-	-	-	-	-	A	-	
B	Karboplatin	B	-	-	-	-	-	-	-		

[Regimbiblioteket](#)

[Patientinformation](#)

[Schema antiemetika och förebygg influensaliknande symtom dag 1](#)

[Allergiprofylax \(inför dag 8\)](#)

Körschema dag 1

	Att göra	Infusionstid	Var ordinerat
1	Kontrollera att patienten tagit antiemetika		Cytodose
1	Sätt spoldropp 500 ml Natriumklorid för spolning före och efter		
3	Ge Gemcitabin spädd i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml intravenöst	30 min	Cytodose
4	Ge Karboplatin spädd i 500 ml Glukos 50 mg/ml intravenöst	30 min	Cytodose

Körschema dag 8

	Att göra	Infusionstid	Var ordinerat

1	Kontrollera att patienten tagit Betapredtabletter		Cytodose
2	Sätt spoldropp 250 ml Natriumklorid för spolning före och efter		
3	Ge Gemcitabin spädd i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml som intravenös infusion	30 minuter	Cytodose