

## Malignt melanom, Vemurafenib (Zelboraf)

Cytodose= ej ännu aktuellt Kurintervall: kontinuerligt

### Indikation

Malignt melanom. Spritt och ickeoperabelt V600 BRAF-muterat malignt melanom (stadie IIIc och IV)

### Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings-tillfälle, fast dos	Antal administrerings-tillfällen/dygn	Doser/cykel	Adm	Dag
A	Vemurafenib (Zelboraf)	960 mg (fast dos)	2*	kontinuerligt	po	Alla

\* Tas med ca 12 timmars mellanrum 1 timme före eller 2 timmar efter måltid

### Övrigt

- Remiss till tandvård skickas inför start (frågeställning: förstadie eller tecken till skivepitelcancer)
- Kontinuerlig tablettbehandling. 8 tabletter per dygn a 240 mg. Patienten får tabletter för första veckan på onkologmottagningen, därefter på recept.
- Kontroller inför start: EKG, CT-thorax, UVB-exponering, hudstatus (innan behandling). Hudstatus månadsvis. EKG månadsvis (i 3 månader) därefter EKG var 3 månad.
- Prover **inför start, samt månadsvis**: Blodstatus (inkl neutrofiler), bilirubin och LD, ASAT, ALAT, ALP, gamma-GT, urea, p-glukos, Na, K, Mg, krea. Blodprover 1 **gång/vecka**: Urat, kreatinin, fosfat.
- Vid återbesök tänk på hudstatus inkl. munhåla/svalg.
- Extra dyr behandling. Apoteket har inte detta i lager. Innan behandlingsbeslut – diskutera med verksamhetschef eller av denne utsedd person
- Patienten får inte exponeras för solljus (Solskydd krävs även vid exponering t ex när patienten sitter i en bil). Se företagets patientinformation. UV-exponeringsriskerna gäller både UVB och UVA.
- Interaktionsbenägen substans. Påverkar CYP 3A4. Bl a följande enzyminducerande substanser sänker effekten av vemurafenib: Karbamazepin, Rifampicin, Fenytoin, Johannesört.
- Fertila kvinnor, graviditetstest före behandlingsstart
- Särskild toxicitet att beakta: Extrem ljuskänslighet (även uv ljus genom fönster kan ge besvär), kutan skivepitelcancer, QT-tidsförlängning
- Vid stor tumörbörda bör Allopurinol ordinerats

### Dosreduktion

- Dosreduktion vid biverkningar -[se FASS](#)

### Patientinformation

- Patienten skall vara muntligt och skriftligt informerad. Patienten skall kontakta onkologkliniken vid nyttillkomna symtom

### Körschema:Vemurafenib

	<b>Att göra</b>	<b>Var ordinerat</b>
1	Getabletter för en vecka samt patientinformation	Läkemedelsjournal för antitumoral behandling (på papper - grönt kort)