

## Angiografi varicocele, instruktion till remittent, röntgen Ryhov

### Kontraindikationer

Vid intravenös kontrast, se dokument ”Intravaskulär jodkontrast vid röntgenundersökning. Information till remitterande enheter”.

### Förberedelser

- Röntgenremiss ska vara skriven och skickad i BoS av remittent.
- Patienten kallas av urologmottagningen (när de erhållit tid från angiografisektionen).
- Patienten är inskriven på dagvårdsplats (urologavdelning).
- Patienten ska vara fastande 2 timmar före ingrepp.
- Patienten ska vara operationsklädd och komma till angiografilabbet i renbäddad säng.
- För patienter över 18 år ska prover finnas klara – PK, TPK och kreatinin. För patienter under 18 år behövs inga prover.
- PVK 1.0 (rosa) ska vara satt.
- Eventuell premedicinering enligt avdelningsläkarens ordination.
- Ange eventuellt tolkbehov, se dokument ”Tolkbehov inför röntgenundersökning”.

### Hur går en undersökning till

- Patienten ska kunna medverka aktivt, då ingreppet utförs under sterila förhållanden, samt kunna ligga stilla och kunna hålla andan en kortare tid vid bildtagning.
- Patienten tvättas och allt kläs sterilt, både patient, personal och apparater som ska användas.
- Ingreppet utförs i lokalbedövning, oftast med stick i höger ljumske.
- Man kartlägger kärlen genom att injicera kontrastmedel i kärlen och då samtidigt ta bilder. Därefter sker embolisering av kärl om det är anatomiskt möjligt.
- Tiden för ingreppet kan variera mellan 2 och 3 timmar.

### Eftervård

Med intravenös kontrast, se dokument

- ”Att tänka på efter röntgenundersökningar efter intravaskulära kontrastmedel”.
- Eftervårdsblankett ”Eftervård vid venös angiografi”.