

Capecitabin samt Fluorouracil - gradering av toxicitet

Biverkning	Mild (grad 1)	Måttlig (grad 2)	Svår (grad 3)	Livshotande (grad 4)
Diarré (Jämför med normal avförings frekvens)	Ökning med 1-3 avföringar per dygn	Ökning med 4-6 avföringar per dygn eller nattlig avföring	Ökning med 7-9 avföringar per dygn eller inkontinens och malabsorption	Ökning med > 9 avföringar per dygn eller voluminösa blodiga diarréer eller behov av parenteral infusion
Hand-fotsyndrom (klinisk)	Domningar, stickningar, erytem utan smärta och svullnad	Smärtsamma erytem, svullnad	Vätskande hudfjällning, ulceration, brännande och svår smärta i händer och fötter	
Hand-fotsyndrom (funktionell)	Obehag, men som inte stör den dagliga aktiviteten	Obehag som stör den dagliga aktiviteten	Svårt obehag, oförmögen att arbeta eller utföra dagliga aktiviteter	
Stomatit	Erytem utan smärta	Smärtsamma erytem, ödem, sår, men det går att äta	Smärtsamma erytem som gör det omöjligt att äta	
Illamående	Kan äta tillräckligt	Minskat matintag med kan äta regelbundet	Oförmögen att äta	
Kräkning	1 episod/24 timmars period	2-5 episoder/24 timmars period	6-10 episoder/24 timmars period	>10 episoder/24 timmars period eller behov av parenteral infusion