

Kostnadsfri vaccination mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio och kikhosta

Regionfullmäktige beslutade i augusti 2022, efter en rekommendation från SKR, att erbjuda kostnadsfri vaccination mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio och kikhosta enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vilka erbjuds kostnadsfri vaccination?

Följande grupper erbjuds kostnadsfri vaccination, vilket innebär att varken besöksavgift eller vaccinkostnad tas ut av patienten:

- Barn och ungdomar som vaccineras inom barnvaccinationsprogrammet, inklusive kompletterande vaccination av nyanlända barn och ungdomar.
- Nyanlända vuxna som har rätt till en hälsoundersökning (asylsökande, personer som omfattas av massflyktningdirektivet m.fl., se [Faktadokument Hälsoundersökning av migranter](#)).
- Övriga vuxna erbjuds vaccination mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp och polio, enligt de doser och intervall som rekommenderas av Folkhälsomyndigheten (se nedan).
- Vaccination mot kikhosta erbjuds kostnadsfritt till gravida. Övriga vuxna som önskar vaccinera sig får betala vaccin och besöksavgift.

Vårdgivaren ersätts för vaccinkostnad och utebliven besöksavgift baserat på att vaccinationen registreras i MittVaccin.

Vissa riskgrupper erbjuds dessutom kostnadsfri vaccination mot hepatit A och B, se [Kostnadsfri vaccination mot hepatit A och hepatit B i Region Jönköpings län](#). I dessa fall debiteras smittskydd för vaccinkostnaden.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer

En förutsättning för att vaccinationen ska vara kostnadsfri är att den utförs enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer som beskrivs nedan. För den som önskar fler vaccin eller doser än vad som beskrivs nedan (t ex pga. resa eller studier utomlands) gäller inte kostnadsfrihet.

Mässling och röda hund

Alla vuxna rekommenderas att ha ett skydd mot mässling och röda hund.

Grundvaccination består av två doser med minst fyra veckors mellanrum. Därefter behövs inga ytterligare påfyllnadsdoser. Den som tidigare bara fått en dos behöver ytterligare en dos (kan ges även om det gått flera år efter den första dosen).

Den som haft genomgången infektion med mässling och röda hund har livslång immunitet och behöver inte vaccineras. Observera dock att den som bara haft en av sjukdomarna behöver vaccineras för att få skydd mot den andra (det finns endast kombinationsvaccin mot mässling, påssjuka och röda hund).

Difteri och stelkramp

Alla vuxna rekommenderas att ha ett skydd mot stelkramp och difteri.

Grundvaccination mot difteri och stelkramp består av tre doser. Intervall mellan den första och andra dosen ska vara minst en månad, den tredje dosen ges minst 6 månader efter dos 2. Därefter rekommenderas en påfyllnadsdos efter 5-10 år.

Vuxna som är grundvaccinerade enligt ovan rekommenderas påfyllnadsdos vart 20:e år.

Polio

Alla vuxna rekommenderas att ha ett skydd mot polio.

Grundvaccination består av fyra doser och detta ger livslångt skydd.

En femte dos rekommenderas till personer som ska resa till område med pågående smittspridning av polio.

En person som enbart fått fyra doser oralt (levande) poliovaccin rekommenderas en dos inaktiverat vaccin.

Kikhosta

Gravida rekommenderas vaccination mot kikhosta i samband med varje graviditet (se även [Vaccination mot kikhosta](#)). Partner eller annan nära anhörig som önskar vaccinera sig i samband med graviditeten omfattas inte av kostnadsfrihet.

Det finns ingen rekommendation om att alla vuxna bör ha skydd mot kikhosta och det är heller inte möjligt att uppnå, eftersom vaccination ger relativt kortvarigt skydd och det saknas ett monovalent kikhostevaccin.