

Gyn Pembrolizumab-Karboplatin-Paclitaxel Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings-tillfälle	Antal administrerings-tillfällen/dygn	Doser/cykel/kur	Adm	Dag
A	Pembrolizumab	2mg/kg, max200 mg	1	1	i.v.	1
B	Paclitaxel	175 mg/m ²	1	1	i.v.	1
C	Karboplatin	AUC 5	1	1	i.v.	1

	Substans/dag	1	Paus dag 2-21	Dag 22 ny cykel
A	Pembrolizumab	A	-	
B	Paclitaxel	A	-	
C	Karboplatin	B	-	

- [Biverkningshantering och kontaktuppgifter](#)
- Vid infusionsreaktion som t.ex. feber, frossa eller värk bör Paracetamol 1000 mg och Desloratadin 5 mg ges. Detta kan också övervägas att ges som premedicinering inför behandlingar därefter.

[Regimbiblioteket](#)

[Patientinformation från regimbiblioteket](#)

[Allergiprofylax](#)

Körschema dag 1

Att göra	Inf tid	Var ordinerat
Ge eller kontrollera att patienten tagit allergiprofylax samt antiemetika		
Akutvagn tillgänglig		-
Sätt spoldropp 250 ml Natriumklorid för spolning före och efter respektive läkemedel		-
Ge Pembrolizumab spädd i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	30 min	Cytodose
Ge Paclitaxel spädd i 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml som intravenös infusion	3 timmar	

Ge Karboplatin spädd i 500 ml Glukos 50 mg/ml som intravenös infusion	30 min	Cytodose
---	--------	----------