

Hjälpmiddel vid graviditetsdiabetes - regler vid förskrivning

För vem?

Gravida och kvinnor i puerperiet (42 dagar efter förlossning) med förhöjda blodsockervärden.

Mål med behandlingen

Att kunna kontrollera blodsockervärde

Att förebygga uppkomsten av makrosomi och förlossningskomplikationer

Förskrivare

Läkare

Diabetessjuksköterska

Barnmorska som genom särskild kurs erhållit intyg på grundkompetens i förskrivning av diabeteshjälpmiddel.

Eget ansvar

- kontrollera blodsocker
- beställa förbruknings varor
- rapportera provsvar till barnmorska.

Inför förskrivning

Förskrivning av hjälpmedel ska föregås av noggrann bedömning och utredning för att undvika att bakomliggande behandlingsbara orsaker förbises. Produkterna utprovas och förskrivas individuellt som komplement till annan behandling. Förskrivare ansvarar för att instruera patienten att ta blodprov.

Tänk på

- Diagnos
- Ålder
- Läkemedel

- Aktivitet
- Ärftlighet
- Kost
- Mentalt hälsotillstånd
- Ekonomi
- Miljö

Vid speciella behov eller behov av produkt utanför avtal bör diabetessjuksköterska konsulteras.

Antal

Grundprincipen är att endast ett hjälpmedel (blodsockermätare) kan förskrivas för att tillgodose samma behov. Särskilda skäl kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip. Blodsockersmätarens serienummer dokumenteras i patientens journal i Obstetrix journalsystem MHV3.

Förbrukningshjälpmedel för graviditetsdiabetes bör förskrivas för max 12 månader (maximalt 4 uttag under 12 månader). Kortare period kan väljas beroende på hur lång tid är kvar fram till beräknad förlossnings datum.

Uppföljning

Uppföljning ska göras kontinuerlig vid varje kontakt med förskrivaren.