

Bröst Epirubicin veckovis

Cytodose= "Bröst Epirubicin 7 d" Cykellängd (kurintervall) 7 dagar

Indikation: palliativ

Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings-tillfälle, mg/m ²	Antal administrerings-tillfällen/dygn	Doser/cykel/kur	Adm	Dag
A	Epirubicin	20	1	1	i.v.	1

	Substans/dag	1	Dag 2-7 behandlingssuppehåll	Dag 8 ny cykel/kur
A	Epirubicin	A	-	

Övrigt

- Ackumulerad dos epirubicin= max 900 mg/m². Vid palliativ behandling med antracyclin ska notering om max ackumulerad dos finnas i canceröversikten från start. Har patienten tidigare i livet behandlats med antracyclin: skriv in år och uppnådd ackumulerad dos.
- [Antimetika vid behov](#)
- UKG - vid symptom
- [Provtagning, rutinmässig](#)

Dosreduktion

Substans	Neutrofila	Neutrofila	TPK	TPK
	≥ 1,0	< 1,0	≥100	<100
Epirubicin	100 %	Behandlingen uppskjutes	100 %	Behandlingen uppskjutes

Patientinformation

Körschema Epirubicin veckovis, bröst

	Att göra	Infusionstid	Var ordinerat
1	Ge eventuell antiemetika		Cytodose
2.	Sätt spoldropp 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml för spolning före och efter respektive läkemedel		-
3.	Ge Epirubicin spädd i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml som intravenös infusion	ca 20 min	Cytodose