

Uro Docetaxel 50 14 d

Cytodose:"Uro Docetaxel 50 14d"

Kurintervall: 14 dagar

Indikation: Prostatacancer, kastraktionrefraktär metastaserad(mCRPC)

Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings- tillfälle, mg/m ²	Antal administrerings- tillfällen/dygn	Doser/cykel/kur	Adm	Dag
A	Docetaxel (Taxotere)	50	1	1	i.v.	1

	Substans/dag	1	Dag 2-14 behandlingsuppehåll	Dag 15 ny cykel/kur
A	Docetaxel	A	-	

Övrigt

- [Antiemetika lågemetogen](#)
- Allergiprofylax: Premedicinering med kortison motsvarande tablett Betametason: 1 tim före behandling tas Betapred 16 tabletter = 8 mg. Dagen efter behandling; på morgonen tas Betapred 8 tabletter = 4 mg.
- Ordinera Prednisolon 10 mg 1x1 kontinuerligt
- Osteoporosprofylax. Om skelettmetastas: överväg zoledronsyra/denosumab för att förebygga skeletthändelse.
- Ge max 15 kurer
- [Provtagning](#)

Dosreduktion

Substans	Neutrofila	TPK
	< 1,5	<100
Docetaxel	Behandlingen uppskjutes i 1 vecka	Behandlingen uppskjutes i 1 vecka

Patientinformation

[Patientinformation Docetaxel](#)

[Allergiprofylax](#)

Körschema

	Att göra	Infusionstid	Var ordinerat
1	Kontrollera att patienten tagit allergiprofylax enligt ovan (under övrigt)		Cytodose
2	Akutvagn tillgänglig		-
3	Sätt spoldropp 250 Natriumklorid 9 mg/ml för spolning före och efter respektive läkemedel		
4	Ge Docetaxel spädd i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml som intravenös infusion	60 minuter	Cytodose