

Differentialdiagnoser

Faktorer som talar för diagnosen (Alla typiska faktorer finns inte hos alla patienter)	
KOL	<p>Debut efter 40 års ålder</p> <p>Lång rökanamnes (mer än 20 paketår)</p> <p>Luftvägsobstruktion som är huvudsakligen irreversibel</p> <p>Långsamt progredierande andnöd, initialt enbart vid ansträngning</p> <p>Hyperinflation på lungröntgen</p>
Astma	<p>Debut i unga år</p> <p>Symtom som varierar från dag till dag</p> <p>Attackvis påkommande symtom</p> <p>Nattliga symtom</p> <p>Atopi och allergi</p> <p>Eosinofili i blod eller sputum</p> <p>Variabel och reversibel luftvägsobstruktion</p>
Hjärtinkompensation (vänsterkammarsvikt)	<p>Basala rassel vid auskultation</p> <p>Normalt PCO₂, eventuellt sänkt PO₂</p> <p>Lungröntgen visar hjärtförstoring och ev. lungödem</p> <p>Ingen luftvägsobstruktion men ev. restriktiv ventilationsnedsättning</p> <p>Normalt NT-proBNP talar emot hjärtsvikt</p>
Lungcancer	<p>Kvarstående infiltrat på lungröntgen</p> <p>Blodhosta</p>

	Relativ snabb ökning av symtomen Isolerat ronchus Smärtor och avmagring
Bronkiektasier	Stora sputummängder Karakteristiska fynd vid CT
Tuberkulos	Tillhör riskgrupp, t ex invandrare från högprevalensländer Infiltrat på lungröntgen Positiv bakteriologi