

Bröst EC 90 (Epirubicin/Cyklofosfamid) 21 dagar

Cytodose: "Bröst EC 21 d Kurintervall 21 dagar

Indikation: Bröstcancer- adjuvant, neoadjuvant

Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings-tillfälle m ²	Antal administrerings-tillfällen/dygn	Doser/cykel/kur	Adm	Dag
A	Epirubicin (Farmorubicin)	90	1	1	i.v.	1
B	Cyklofosfamid (Sendoxan)	600	1	1	i.v.	1
C	Filgrastim (1:a val, 2:a val Pegfilgrastim)	Standarddos med avseende på pat vikt	1	8 (om Pegfilgrastim=1)	s.c.	4-11 (2 om PEG)

	Substans/dag	1	Paus dag 2-21	Dag 22 ny cykel/kur
A	Epirubicin	A		
B	Cyklofosfamid	B		

Övrigt

- [Antiemetika:Högemetogent](#) (Akinzeo delas ut av sjuksköterska, ej på recept.)
- Inför adjuvant antracyclinbehandling ska en kardiovaskulär riskbedömning göras, se lokala riktlinjer bröstcancer.
- G- CSF ingår i regimen och ska sättas in i 8 dagar (dag 4-11), rekommenderad dos : <70 kg, 30 ME respektive >70 kg, 48 ME. Ordineras i Cosmic. Delas ut av sjuksköterska, ej på recept. I första hand Filgrastim, om inte detta tolereras kan Pegfilgrastim ges
- Ackumulerad dos epirubicin=max 900mg/m²
- Dosreduktion vid nedsatt leverfunktion
- [Provtagning, rutinmässig](#)

Dosreduktion

Substans	Neutrofila	Neutrofila	TPK	TPK
	≥ 1,0	< 1,0	≥ 100	<100
Epirubicin	100 %	Behandlingen uppskjutes	100 %	Behandlingen uppskjutes
Cyklofosfamid	100 %	Behandlingen uppskjutes	100 %	Behandlingen uppskjutes

- [Patientinformation](#)
- [Högemetogent](#)

Körschema

	Att göra	Infusionstid	Var ordinerat
1	Kontrollera att patienten tagit antiemetika		
2	Sätt spoldropp 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml för spolning före och efter respektive läkemedel		-
3.	Ge Epirubicin spädd i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml som intravenös infusion	30 minuter	Cytodose
4.	Ge Cyklofosfamid spädd i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml som intravenös infusion	20 minuter	Cytodose
5	Lämna ut filgrastim för 8 dagar (alt Pegfilgrastim 1 spruta) Om inte filgrastim är ordinerat, påminn läkare att ordinera detta i Cosmic.		Cosmic