

GI Durvalumab 1500 mg 21d/28 d

Kurintervall: 28 dagar

Indikation: Gallvägscancer 21 d i kombination med Cisplatin-Gemcitabin* upp till 8 kurer. Se regimbeskrivning Durvalumab – Cisplatin – Gemcitabin 2 1 d. Därefter ges singelbehandling Durvalumab 28 d till progress.

* Om kontraindikation för Cisplatin föreligger kan Durvalumab kombineras med Gemox, se separat regimbeskrivning.

HCC palliativ 1:a linjen

Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings-tillfälle, mg	Antal administrerings-tillfällen/dygn	Doser/cykel	Adm	Dag
A	Durvalumab (Imfinzi)	1500 mg (standarddos)	1	1	i.v.	1

	Substans/dag	1	Paus dag 2-21	Dag 22 ny cykel
A	Durvalumab (Imfinzi) (i kombination med cytostatika)	A	-	

	Substans/dag	1	Paus dag 2-28	Dag 29 ny cykel
A	Durvalumab (Imfinzi) (i kombination med Tremelimumab och som singelbehandling)	A	-	

Övrigt

- Dosbekräfta inte förrän patienten är "på plats" och är bedömd av läkare. Preparatet är dyrt samt har kort hållbarhet efter beredning (24 timmar efter beredning). Förpackningsstorlek: 120 mg samt 500 mg.
- För immunorelaterade biverkningar: [Biverkningshantering](#) och [Kontaktuppgifter till konsult](#)
- Patient med TB eller Hepatit-anamnes, kontakta infektion.

- Vid infusionsreaktion som t.ex. feber, frossa eller värk bör Paracetamol 1000 mg och Desloratadin 5 mg ges. Detta kan också övervägas att ges som premedicinering inför behandlingar därefter.
- Dosreduceras ej. Uppehåll eller behandlingsavslut görs vid svårare toxicitet, och då ska också behandling med steroider övervägas, se [FASS](#).
- Patienter med kroppsvikt 36 kg eller lägre får viktbaserad dosering 20 mg/kg
- [Provtagning immunoterapi singel](#)

Biverkningar

Grad I	Symtomatisk behandling
Grad II	Uppehåll med behandling. Steroid behandling motsvarande Prednisolon 1-2 mg/kg per dag. Reduceras när biverkningar är grad I, minst 4 veckors steroidbehandling
Grad III- IV	Behandlingen utsättes permanent. Metylprednisolon i.v. 125 mg dag 1, därefter Prednisolon 1-2 mg/kg per dag p.o. Om ej svar på prednisolon ge Infliximab (Remicade) 5 mg/kg x 1

[Patientinformation \(ändra diagnos\)](#)

Körschema

Att göra	Infusionstid	Var ordinerat
1 Akutvagn tillgänglig		-
2 Sätt spoldropp 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml		
3 Ge Durvalumab spädd i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml som intravenös infusion	60 minuter	Cytodose

Telefonkontakt med patienten till sjuksköterska 1 vecka efter första behandlingen, därefter individuell bedömning. Kontroll av immunorelaterade biverkningar.