

GI Durvalumab – Tremelimumab UNDER ARBETE

Cytodose: "GI Durvalumab 1500 mg-Tremelimumab 300 mg"

Indikation: HCC, palliativ, 1:a linjen, 2:a handsval om ej bedöms lämpligt med Atezolizumab-Bevacizumab. AntCTLA-4 + anti PDL1

Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings-tillfälle, mg	Antal administrerings-tillfällen/dygn	Doser/cykel	Adm	Dag
A	Tremelimumab	300 mg (standarddos)	1	1	i.v.	1
B	Durvalumab	1500 mg (standarddos)	1	1	i.v.	1

Följt av:

	Substans (preparat)	Dos/administrerings-tillfälle, mg	Antal administrerings-tillfällen/dygn	Doser/cykel	Adm	Dag
A	Durvalumab	1500 mg (standarddos)	1	1	i.v.	1

	Substans/dag	Dag 1	Paus dag 2-28	Ny kur dag 29 med endast Durvalumab
A	Tremelimumab	A	-	
B	Durvalumab	B	-	

Övrigt

- Tremelimumab ges endast en gång tillsammans med Durvalumab och därefter fortsätter behandlingen med Durvalumab var 4:e vecka som startar dag 29. Se separat regim med Durvalumab.
- För patienter med låg vikt doseras båda läkemedel baserad på kroppsvikt. Tremelimumab: Patient mindre än 40 kg – 4 mg/kg kroppsvikt. Durvalumab: Patient mindre än 30 kg – 20 mg/kg kroppsvikt
- [Biverkningshantering och kontaktuppgifter](#)
- Apoteket har inte Tremelimumab i lager. Beställ i god tid.
- Dosbekräfta till apoteket när patienten är "på plats" och mår bra. Preparaten är dyra.
- Preparaten är immunstimulerande. Risken för biverkningar är stor.
- Vid infusionsreaktion som t.ex. feber, frossa eller värk bör Paracetamol 1000 mg och Desloratadin 5 mg ges. Detta kan också övervägas att ges som premedicinering inför behandlingar därefter.
- Patient med TB eller Hepatit-anamnes, kontakta infektion
- [Provtagning immunoterapi kombinerad](#)

Dosreduktion

- Dosreduceras ej. Avstå från behandlingstillfälle vid toxicitet.

[Patientinformation Durvalumab-Tremelimumab](#)**Körschema**

Att göra	Infusionstid	Var ordinerat
Akutvagn tillgänglig		
Sätt spoldropp 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml för spolning före och efter varje preparat		
Puls och blodtryck före start		
Ge Tremelimumab spädd i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml	1 timme	Cytodose
Ge Durvalumab spädd i 100 Natriumklorid 9 mg/ml	1 timme	Cytodose

Anmärkningar

Telefonkontakt med patienten till sjuksköterska 1 vecka efter första behandlingen, därefter individuell bedömning. Kontroll av immunorelaterade biverkningar.