

GI Pemigatinib (Pemazyre) po 21 d (under arbete 250214)

Kurintervall: 21 dagar

Indikation: Koloangiocarcinom lokalt avancerat eller metastaserat med fusion eller rearrangemang av fibroblasttillväxtfaktorreceptor 2 (FGFR2) som har progredierat efter minst en tidigare linje systemisk behandling.

	Substans (preparat)	Dos/administrerings-tillfälle	Antal administrerings-tillfällen/dygn	Doser/cykel/kur	Adm	Dag
A	Pemigatinib (Pemazyre)	13,5 mg (fast dos)	1	14	p.o.	1-14

	Substans/dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Paus dag 15-21	Dag 22 ny kur
A	Pemigatinib	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	

Övrigt

- Receptförskrivning
- Provtagning inför start: Blodstatus, leverstatus, njurstatus, fosfat, p-glukos. Veckovisa prover: njurstatus, fosfat kur 1 och 2.
- Veckovis uppföljning av sjuksköterska kur 1 och 2
- Vanliga biverkningar:
 - Hyper-/hypofosfatemi – utvecklas vanligtvis inom de första 15 dagarna. Dietistkontakt – fosfatfattig kost ska inledas när serumfosfatnivån är > 5,5 mg/dl (= 1,77 mmol/L) och tillägg av en fosfatsänkande behandling bör övervägas när nivån är 7 mg/dl (= 2,26 mmol/L). Dosen av fosfatsänkande behandling ska justeras till serumfosfatnivån återgår till < 7 mg/dl (=2,26 mmol/L). Uppehåll av fosfatsänkande behandling och kost ska övervägas under behandlingsuppehåll med Pemigatinib eller om serumfosfatnivån faller under normalintervallet.
 - Exudativ näthinneavlossning (dimsyn, flytande fläckar i synfältet), torra ögon, torr hud, PPE, alopeci, nageltoxicitet, stomatit, smakförändringar, illamående, diarré, trötthet, ledvärk
 - Hyponatremi, kreatininstegring

Dosreduktion

Dosjusteringar eller avbrytande av dosering ska övervägas för hantering av toxiciteter, se [FASS](#) Standard-dos: 13,5 mg x 1 i 14 dagar, första dosreduktion: 9 mg x 1 i 14 dagar, andra dosreduktion 4,5 mg x 1 i 14 dagar. Behandlingen ska avbrytas permanent om patienten inte tolererar 4,5 mg.

Patientinformation

Patientinformation

Körschema

1	Patienten får recept	Cosmic
2	Informera om att ta tabletten en gång per dag, förslagsvis till natten i 14 dagar därefter paus i 7 dagar. Tabletten ska sväljas hel med eller utan mat. Om en dos glöms med mer än 4 timmar eller kräks upp tas den ej igen utan vänta till nästa dos. Grapefruktjuice och johannesört ska undvikas under tiden pemigatinib intas.	