

Bröst Palbociclib (Ibrance) 28 d

Kurintervall 28 dagar

Indikation: ER+/HER2- lokalt avancerad eller metastaserad bröstcancer

Behandling

Substans (preparat)	Dos/administrerings-tillfälle, mg	Antal administrerings-tillfällen/dygn	Doser kur	Adm	Dag
A Palbociclib (Ibrance)	125	1	21	p.o.	1-21

Substans/dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	Paus dag 22-28	Dag 29 ny cykel/kur	
A Palbociclib	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	

Övrigt

- [Riktlinjer för ribociclib och palbociclib biverkningar](#)
- Sjuksköterska kontrollerar prover och meddelar patienten att proverna är bra och när ny kur ska starta om blodstatus är OK d.v.s. neutrofila $\geq 1,0$ och trombocyter ≥ 100 . Vid avvikande värden, EKG kontroller eller tveksamheter ska sjuksköterska kontakta läkare; 1. PAL, 2. Cytordinatör, 3. Dagjour
- [Antiemetika vid behov](#)
- [Dosering läkemedelsföretag](#)

Dosreduktion

Rekommenderad dos	1:a gången	2:a gången	3:e gången
125 mg/dag	100 mg/dag	75 mg/ dag	Avsluta behandlingen

Patientinformation

Körschema

- | | |
|---|---|
| 1 | <p>Patienten får recept</p> <p>Informera patienten om att ta tablettarna vid ungefär samma tid varje dag. Om patienten kräks eller missat en tablett ska ingen extra dos tas den dagen.</p> <p>Nästa ordinerade dos tas vid den vanliga tiden</p> |
|---|---|