

## Bröst Docetaxel 100 21 d

Cytodose: "Bröst Docetaxel 100, 21 d" Kurintervall: 21 dagar

Indikation: neo/adjuvant

### Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings-tillfälle, mg/m <sup>2</sup>	Antal administrerings-tillfällen/dygn	Doser/cykel/kur	Adm	Dag
A	Docetaxel (Taxotere)	100	1	1	i.v.	1
B	Filgrastim alt Pegfilgrastim	Standarddos med avseende på pat vikt	1	8 (om Pegfilgrastim=1)	s.c.	4-11

	Substans/dag 1	Dag 2-21 behandlingsuppehåll (dock filgrastim dag 3-11)	Dag 22 ny cykel/kur
A	Docetaxel	A -	
B	Filgrastim	Ges dag 4-11	

### Övrig

#### Allergiprofylax:

Dagen före behandling; 12 tabletter Betapred 0,5 mg på morgonen och 12 tabletter Betapred 0,5 mg till kvällen

Behandlingsdagen: 12 tabletter Betapred 0,5 mg på morgonen

Dagen efter behandling: 12 tabletter Betapred 0,5 mg på morgonen

#### [Antiemetika vid behov](#)

G-CSF ska sättas in dag 4-11. Rekommenderad dos av filgrastim är 0,5 ME/kg/dag (5 mikrogram/kg/dag)

- Den första dosen filgrastim (peg-filgrastim) får ges tidigast 24 timmar efter avslutad cytostatikaterapi.
- Rekommenderad dos riktlinjer: <70 kg, 30 ME respektive >70 kg, 48 ME. Ordineras i Cosmic. Delas ut av sjuksköterska, ej på recept.
- [Provtagning, rutinmässig](#)

**Dosreduktion**

Substans	Neutrofila	TPK
	< 1,0*	<100
Docetaxel	Behandlingen uppskjutes	Behandlingen uppskjutes

\* Efter episod med febril neutropeni eller långvarig neutropeni (ANC<0,5) under en vecka eller längre rekommenderas dosreduktion

**Patientinformation**

[Allergiprofylax](#)

**Körschema**

	Att göra	Infusionstid	Var ordinerat
1.	Kontrollera att patienten tagit Betapred dagen innan (morgon och kväll) samt 12 tabletter samma dag		Recept
2	Akutvagn tillgänglig  Under de första 15 minuterna av infusionen vid första behandlingstillfället skall läkare finnas tillgänglig inom 1-2 minuter. D.v.s. läkare befinner sig nära platsen där patienten och sjuksköterskan finns, eller har någon form av "akutsökare" på sig.		
3	Sätt spoldropp 250 ml Natriumklorid för spolning före och efter Docetaxel		
4	Ge Docetaxel spädd i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml som intravenös infusion.  Om patienten fick biverkningar förra gången, eller om patienten är högrisk för allergisk reaktion bör infusionshastigheten dessutom vara lägre än normalt.	60 minuter	Cytodose
5	Lämna ut filgrastim enligt ordination		Cosmic
6	Säkerställ att patienten vet att allergiprofylax med tablett Betapred skall tas dag 2		