

Gyn Doxorubicin lipo 40 (Caelyx)

Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings-tillfälle, mg/m ²	Antal administrerings-tillfällen/dygn	Doser/cykel/kur	Adm	Dag
A	Doxorubicin liposomalt (Caelyx)	40	1	1	i.v.	1

	Substans/dag	1	Dag 2-28 behandlingsuppehåll	Dag 29 ny cykel/kur
A	Doxorubicin (liposomalt)	A	-	

[Regimbiblioteket](#)

[Patientinformation om betapred](#)

Körschema kur 1 samt 2 samt om patienten har reagerat

	Att göra	Infusionstid	Var ordinerat
1	Akutvagn tillgänglig. Blodtryckskontroll före start vid de första två behandlingarna. Om patienten har reagerat ta blodtryck innan varje start.		-
2	Ge eller kontrollera att patienten har tagit allergiprofylax.		Cytodose
4	Sätt spoldropp 500 ml Glukos 50 mg/ml för spolning före och efter Doxorubicin liposomalt, inkompatibelt med NaCl		Cytodose
5	Ge Doxorubicin liposomalt (Caelyx) spädd i 250 ml Glukos 50 mg/ml intravenöst.	2 timmar kur 1 1 timme kur 2	Cytodose

Körschema UNDERHÅLLSDOS

	Att göra	Infusionstid	Var ordinerat
1	Akutvagn tillgänglig.		-
4	Sätt spoldropp 500 ml Glukos 50 mg/ml för spolning före och efter Doxorubicin liposomalt, inkompatibelt med NaCl		Cytodose

5	Ge Doxorubicin liposomalt (Caelyx) spädd i 250 ml Glukos 50 mg/ml intravenöst.	1 timme	Cytodose
---	--	---------	----------