

GI FLV 14 d

Kurintervall: 14 dagar

Indikation: GI, metastaserande colorektalcancer

Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings-tillfälle mg/m ²	Antal administrerings-tillfällen/dygn	Doser/cykel/kur	Adm	Dag
A	Fluorouracil (5-FU)	500	1	2	i.v.	1,2
B	Kalciumfolinat	60	1	2	i.v.	1,2

	Substans/dag	1	2	Paus dag 3-14	Dag 15 ny cykel/kur
A	Fluorouracil	A	A	-	
B	Kalciumfolinat	B	B	-	

Övrigt

- Testa för DPYD-brist innan behandling ges.
- [Antiemetika vid behov](#)
- [Provtagning](#)

Dosreduktion hematologi

Neutrofila	TPK	Fluorouracil	Calciumfolinat
> 1,5	>75	100 %	100 %
1,1 - 1,5	50 - 75	50-75 %	100 %
≤ 1,0	< 50	Behandlingen uppskjutes en vecka. Överväg dosreduktion vid nästa kur.	

Dosreduktion icke-hematologisk toxicitet enligt NCIC-gradering

Substans	1:a gången	2:a gången	3:e gången	4:e gången
Grad I	Fortsätt behandlingen	Fortsätt behandlingen	Fortsätt behandlingen	Fortsätt behandlingen
Grad II	Gör uppehåll och återuppta (fulldos) vid tox grad 0-I	Gör uppehåll och återuppta (75 % av fulldos) vid tox 0-I	Gör uppehåll och återuppta (50 % av fulldos) vid tox 0-I	Avsluta behandlingen
Grad III	Gör uppehåll och återuppta (75 % av	Gör uppehåll och återuppta (50 % av	Avsluta behandlingen	

	fulldos) vid tox 0-I	fulldos) vid tox 0-I		
Grad IV	Avsluta behandlingen			

[Biverkningar - gradering av toxicitet i samband med behandling med fluorouracil](#)

[Patientinformation FLV](#)

Körschema dag 1 och 2

	Att göra	Infusionstid	Var ordinerat
1	Sätt spoldropp 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml för spolning före och efter respektive läkemedel		
2	Ge Fluorouracil spädd i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml som intravenös infusion	5-10 minuter	Cytodose
3	Paus (låt spoldroppet gå)	30 min	Cytodose
4	Ge Kalciumfolinat som intravenös bolus injektion	3-5 minuter	Cytodose