

## Gyn Paclitaxel vv80 - Karboplatin

	Substans (preparat)	Dos/administrerings-tillfälle, mg/m <sup>2</sup>	Antal administrerings-tillfällen/dygn	Doser/cykel/kur	Adm	Dag
A	Paclitaxel	80	1	3	i.v.	1, 8, 15
B	Karboplatin	AUC 5*	1	1	iv	1

\* Calverts formel  $Dos (mg) = (\text{planerad AUC}) \times (\text{GFR ml/min} + 25)$ .

	Substans/dag	1	2-7	8	9-14	15	Dag 22 ny cykel/kur
A	Paclitaxel	A	-	A	-	A	
B	Karboplatin	B	-	-	-	-	

Kombinationen saknas på Regimbiblioteket RCC.

### [Patientinformation inför dag 1 antiemetika allergiprofylax](#)

Patientinformation till dag 8, 15. Allergiprofylax: Be patienten ta 8 mg Betapred (16 tabletter) samt 10 mg Desloratadin (2 tabletter).

### Nedan= onkologens körschema kur 1 och 2 samt om patienten har reagerat vid tidigare tillfällen

Att göra	Inf tid	Var ordinerat
Ge eller kontrollera att patienten tagit allergiprofylax samt antiemetika		
Akutvagn tillgänglig		-
Sätt spoldropp 250 ml Natriumklorid för spolning före och efter respektive läkemedel		
Ge Paclitaxel spädd i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml som intravenös infusion  Blodtryckskontroll före start vid de första två behandlingarna. Stanna kvar hos patienten de första 15 min av infusionen de	2 timmar kur 1+2 samt om patienten har reagerat (1 timme annars, se nedan )	Cytodose

två första behandlingarna. Om patienten har reagerat ta blodtrycks kontroll innan varje start.		
Ge Karboplatin spädd i 500 ml Glukos 50 mg/ml som intravenös infusion	30 min	Cytodose

**Körschema Paclitaxel UNDERHÅLLSDOS (dag 8,15...om patienten inte har reagerat allergiskt)**

Att göra	Inf tid	Var ordinerat
Kontrollera att patienten tagit allergiprofylax enligt ordination i cytodose		-
Sätt spoldropp 250 ml Natriumklorid för spolning före och efter		
Ge Paclitaxel spädd i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml som intravenös infusion Inga rutinmässiga blodtrycks kontroller vid underhållsdos.	1 timme	Cytodose