

Uro Gemcitabin Karboplatin

Cytodose="Uro Karbo- Gemcitabin 21 d"

Cykellängd (kurintervall)21 dagar

Indikation

Blåscancer, palliativ, i vissa fall induktionsbehandling

Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings-tillfälle, mg/m ²	Antal administrerings-tillfällen/dygn	Doser/cykel/kur	Adm	Dag
A	Gemcitabin (Gemzar)	1000	1	2	i.v.	1,8
B	Karboplatin (Paraplatin)	AUC=5*	1	1	i.v	1

* Calverts formel Dos (mg)=(planerad AUC) x (GFR ml/min + 25).

	Substans/dag	1	2	3	4	5	6	7	8	Paus dag 9-21	Dag 22 ny cykel/kur
A	Gemcitabin	A	-	-	-	-	-	-	A	-	
B	Karboplatin	B	-	-	-	-	-	-	-		

Övrigt

- [Antiemetika högemetogen](#) (Akynzeo delas ut av sjuksköterska, ej på recept.)
- Ordinera T. Betapred 16 tabletter (8 mg) inför behandling (för att förebygga influensaliknande symtom)
- Iohexolclearance. Använd det okorrigerade värdet för dosering av karboplatin.
- Dag 8 skjuts ej upp. Om man inte kan ge denna hoppar man över, och fortsätter behandling dag 1.
- GCSF utifrån individuell bedömning.
- [Rutinmässig provtagning](#)

Dosreduktion icke-hematologisk toxicitet enligt NCIC -gradering

Substans	1:a gången	2:a gången	3:e gången	4:e gången
Grad I	Fortsätt behandlingen	Fortsätt behandlingen	Fortsätt behandlingen	Fortsätt behandlingen
Grad II	Återuppta (fulldos) vid tox 0-1	Återuppta (75 % av fulldos) vid tox 0-1	Återuppta (50 % av fulldos) vid tox 0-1	Avsluta behandlingen
Grad III	Återuppta (75 % av	Återuppta (50 % av	Avsluta	

	fulldos) vid tox 0-1	fulldos) vid tox 0-1	behandlingen	
Grad IV	Avsluta behandlingen			

Dosreduktion hematologi

Substans	Neutrofila	TPK
	< 1,5	<100
Båda preparaten	Behandlingsuppehåll i en vecka.	Behandlingsuppehåll i en vecka.

Patientinformation

[Schema antiemetika och förebygg influensaliknande symtom](#)

Körschema Karboplatin - Gemcitabin, dag 1

	Att göra	Infusionstid	Var ordinerat
1	Kontrollera att patienten tagit antiemetika		
1	Sätt spoldropp 250 ml Natriumklorid för spolning före och efter		
3	Ge Gemcitabin spädd i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml intravenöst	30 min	Cytodose
4	Ge Karboplatin spädd i 500 ml Glukos 50 mg/ml intravenöst	30 min	Cytodose

Körschema Karboplatin- Gemcitabin, dag 8

	Att göra	Infusionstid	Var ordinerat
1	Kontrollera att patienten tagit Betapredtabletter		
2	Sätt spoldropp 250 ml Natriumklorid för spolning före och efter		
3	Ge Gemcitabin spädd i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml som intravenös infusion	30 minuter	Cytodose