

Bröst Ribociklib (Kisqali) 28 d

Kurintervall: 28 dagar

Indikation: ER+/HER2- lokalt avancerad eller metastaserad bröstcancer. Vid behandling av premenopausala kvinnor ges samtidig behandling med GnRH-analog.

Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings-tillfälle	Antal administrerings-tillfällen/dygn	Doser kur	Adm	Dag
A	Ribociklib	3 tabletter a 200 mg intas samtidigt	1	28	p.o.	1-21

Substans/dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	Paus dag 22-28	Dag 29 ny cykel/kur
A Ribociklib	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	

Övrigt

- [Riktlinjer för ribociclib och palbociclib biverkningar](#)
- EKG kur 1 dag 1 och 14 (QT- tid) QT. EKGt ska vara "godkänt" av onkologläkare innan nästa kur påbörjas
- Formel för beräkning av QT- tid (använd Fridericia, QTcF):
<https://www.mdcalc.com/corrected-qt-interval-qtcf>
- Provtagning: se ovan under riktlinjer (PPT-fil)
- [Doseringsguide fass](#)
[Doseringsguide företaget](#)

Dosreduktion

Rekommenderad dos	1:a gången	2:a gången	3:e gången
600 mg/dag	400 mg/dag	200 mg/ dag	Avsluta behandlingen

Patientinformation

Körschema Ribociklib (Kisqali) dag 1-21

1	Patienten får recept med två uttag första gången	
---	--	--

Anmärkningar

- EKG tas av undersköterska på onkologen. För långväga patienter kan EKG tas på vårdcentral och bedömas av onkologläkare.

- Dosering i förhållande till måltid: Tas med eller utan föda vid ungefär samma tidpunkt varje dag. Vid missad dos eller vid kräkning ska ingen ny dos tas samma dag. Ta nästa dos vid vanlig tid.
- Grapefrukt, grapefruktjuice ska undvikas då detta kan öka biverkningarna. Även johannesört bör undvikas då det påverkar effekten av läkemedlet. Spår av jordnötter och soja kan förekomma (kontraindicerat till allergiker).
- Uppmana patienten att hämta ut recept på Ryhov (63 st. förpackning ska finnas i lager)