

Bröst Apelisib (Piqray)

Cykellängd: Kontinuerligt

Indikation: Vid PIK3CA- muterad lokalt avancerad eller metastaserad ER+/HER2-bröstcancer i kombination med Fulvestrant

Behandling

Substans (preparat)	Dos/administrerings-tillfälle, mg	Antal administrerings-tillfällen/dygn	Doser kur	Adm	Dag
A Apelisib - Piqray	300	1	28	p.o.	1-28

Substans/dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Dag 29 ny cykel/ku
A Apelisib - Piqray	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	

Övrigt

[Antiemetika vid behov](#)

OBS! Biverkningar ska diskuteras med bröstspecialist

Tabletterna finns i styrkorna 150 mg, 200 mg och (200+50 mg)

Mutationsanalys för PIK3CA skickas via Patologen vidare till Kalmar för analys.

Ordineras i cosmic (läkemedelslistan) och canceröversikten (frasminne behandlingsplan)

Provtagning, dosering och biverkningar

Kontroll av blod-, lever- och elektrolytstatus när kliniskt indicerat.

Ökad risk för hyperglykemi. Konsultation med endokrinolog för riskpatienter (diabetes, prediabetes).

Remiss (akutremiss+ sjuksköterska ska ringa vårdcentral) till diabetessjuksköterska på vårdcentral för instruktion och utlämning av blodsockermätare

Hyperglykemi

[Kontroll av fasteglukos och HbA1c](#)

Hantering av hyperglykemi samt ev. profylax med Metformin, se [Hantering av biverkningar](#).

Hudutslag

Profylaktisk antihistamin första 8 veckorna med 10 mg Ceterizin eller 10 mg Loratidin, se [Hantering av biverkningar](#)

Artikel: [Managing hyperglycemia and rash associated with alpelisib: expert consensus recommendations using the Delphi technique \(npj Breast Cancer \(2024\) 10:12\)](#)

Fördröjd diarré

Diarré är en vanlig biverkan- anvisningar och recept på Loperamid.

Dosering och biverkningshantering från företaget: [LÄNK](#)

Dosreduktion

Rekommenderad dos	1:a gången	2:a gången	3:e gången
300 mg/dag	250 mg/dag	200mg/ dag	Avsluta behandlingen

[Patientinformation](#)

Körschema, Alepelisib (Piqray)

1	Patienten får recept
	Informera patienten om att ta tablettarna direkt efter måltid vid ungefär samma tid varje dag. Vid missad dos tas tablettarna efter måltid om det gått mindre än 9 timmar Om patienten kräks eller missat en tablett och det gått mer än 9 timmar ska ingen extra dos tas den dagen. Nästa ordinerade dos tas vid den vanliga tiden.