

CT Skelett, ryggrad, bäcken och extremiteter

Kontraindikationer

Vid intravenös kontrast, se separat dokument.

- Intravaskulär jodkontrast vid röntgenundersökning. Information till remitterande enheter.

Förberedelser

- Alla smycken och kläder (med metall detaljer) som finns i undersökningsområdet ska vara bortplockade.
- Ange eventuellt tolkbehov, se separat dokument.
 - Tolkbehov inför röntgenundersökning.

Oftast utan intravenös kontrast men vid vissa frågeställningar kan det behövas ges intravenös kontrast.

Vid intravenös kontrast

- Patienten ska vara välhydrerad.
- Aktuellt S/Kreatinin (elektiva patienter inte äldre värde än 3 månader, akuta/inneliggande patienter inte äldre värde än 24 timmar) samt längd och vikt ska finnas i Cosmic.
- Ifyllt och undertecknat frågeformulär ska medfölja patienten till röntgen, se separat frågeformulär.
 - Frågor att besvara inför röntgenundersökning med jodkontrastmedel
- Väl fungerande PVK (inte handrygg), storlek enligt information från röntgen, godkänd venport (surecan Safety venportsnål 19G) eller piccline ("Power PICC SOLO" 5 ml/s Max) ska finnas.

Om patienten inte kan ligga still på grund av oro eller smärta måste han/hon ha någon form av premedicinering.

Hur går en undersökning till

Patienten ska kunna ligga stilla vid bildtagning (cirka 30 sekunder/scan)

Eftervård

Utan intravenös kontrast: Ingen eftervård

Med intravenös kontrast, se separat dokument.

- Att tänka på efter röntgenundersökningar efter intravaskulära kontrastmedel.