

Lung Krizotinib (Xalkori)

Kontinuerlig behandling. Tyrosinkinashämmare.

Indikation

Behandling av vuxna med **tidigare** behandlad ALK-positiv avancerad icke småcellig lungcancer (NSCLC). ALK-positiv NSCLC-status ska fastställas innan behandling med Xalkori påbörjas. Samt ROS1-mutation. Första linjens behandling. Underhållsbehandling.

Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings-tillfälle, mg	Antal administrerings-tillfällen/dygn	Doser/cykel	Adm
A	Krizotinib (Xalkori)	250 mg	2	Kontinuerlig behandling	p.o.

Kapselstyrkor: 200 mg samt 250 mg

Administrering

Kapslarna ska sväljas hela, helst med vatten och inte krossas, delas eller tuggas. Med eller utan föda.

Om en dos skulle missas: om >6 timmar till nästa dos ska missad dos tas så fort som möjligt dock inte om <6 timmar till nästa dos. Patienten ska INTE ta 2 doser samtidigt som kompensation.

Undvik samtidigt intag av grapefruk eller grapefruktjuice (ökad plasmakoncentrationer av Xalkori) samt johannesört (minskad plasmakoncentrationer av Xalkori) under behandlingstiden.

Biverkningar

Informera om allvarliga biverkningar:

Leverpåverkan.

EKG med QT-förlängning och/eller bradykardi som kan ge ostadighet/yrsel, obehagskänslor i bröstet, oregelbunden puls.

Informera om mycket vanliga biverkningar:

Uppkördhet såsom illamående, kräkningar, diarré och förstoppning.

Synrubbingar i form av ljusblixtar, dimsyn och/eller dubbelseende. Av 6 personer drabbas 10, OBS! Iaktta försiktighet vid framförande av fordon eller användningen av maskiner!

Trötthet och yrsel.

[Patientinformation](#)

Övrigt

EKG samt labprover, se nedan under uppföljning, ska tas så nära före den första dosen Xalkori som möjligt.

Behandling fortsätter till tumörprogress.

Körschema

Att göra	
1	Skriv recept + säkerställ att patienten vet hur han/hon skall ta kapslarna. Informera om att varan kan ta tid att beställa hem från lokalt apotek.

Uppföljning

Avseende biverkningar som synrubbingar, illamående/kräkningar, diarré, yrsel, påverkan på labprover, se följande behandlingsguide, via telefon med sjuksköterska inom **1 vecka** efter behandlingsstart?

Leverstatus, njurstatus, blodstatus/neutrofila, magnesium, CRP varje vecka under de 2 första månaderna och därefter en gång per månad. Se paket Xalkori i provmenyn.

EKG och blodtryck varannan vecka, om möjligt på vårdcentral annars på cytmottagningen.

Hos läkare inledningsvis efter 4 veckor med lungröntgen, EKG, labprover samt klinisk bedömning.