

Regimbeskrivning Infliximab (Remicade, Zessly)

Kurintervall: Behandlingen kan upprepas om kliniskt indicerat

Indikation: Mott immunoterapirelaterad biverkan

Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings-tillfälle, mg/kg	Antal administrerings-tillfällen/dygn	Doser/cykel/kur	Adm	Dag
A	Infliximab (Remicade, Zessly)	5 mg (avrunda till närmaste 100, max 10%)	1	1	i.v	1

Inför behandling

- Beställ läkemedel. Bereds på vårdenheten, Ordineras i Cosmic.
- Provtagning: Före start: Blodstatus, neutrofila, SR, CRP, kreatinin, leverstatus, om indikation kolit, F-Kalprotektin
- HBsAg, Anti-HBc, Hepatit C antikroppar
- Före behandlingen påbörjas måste alla patienter kontrolleras avseende både aktiv och inaktiv ("latent") tuberkulos med radiologi och IGR
- Avrunda uppåt till närmaste 100, max 10% (maxdos 500 mg)
- Ingen dosreduktion vid upprepad behandling
- Ges oftast som en engångsdos vid ovan indikation men kan upprepas 2 veckor efter första dos

Under behandling

- Patienten övervakas avseende överkänslighetsreaktioner med upprepade kontroller av blodtryck, puls och AT
- Allergiska reaktioner kan uppstå under pågående infusion och upp till 1-2 timmar efter avslutad infusion.
- Patienten får ej ha pågående infektion
- Biverkningar, se [FASS](#)
- [Inflammatorisk tarmsjukdom \(IBD\)- behandling med Infliximab/Adalimumab \(Västra Götalandsregionen\)](#)

Körschema

Att göra	Infusionstid	Var ordinerat
Blanda Infliximab i 250 ml Natriumklorid, se FASS. Använd PVC – fritt filter och aggregat (finns att hämta på tillverkningen, apoteket)		

Akutvagn tillgänglig Ta blodtryck, puls före start av behandling		
Ge Infliximab (Remicade) intravenöst spädd i Natriumklorid 9 mg/ml 250 ml	2 timmar (vid de 3 första behandlingarna, därefter 1 timma)	Cosmic
Ta blodtryck och puls 1 timma efter start och vid avslutad behandling de tre första behandlingarna.		
Patient ska observeras 30 minuter efter avslutad infusion		