

## Lung Osimeritinib (Tagrisso)

Kontinuerlig behandling. Proteinkinashämmare

### Indikation

Icke småcellig lungcancer

### Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings-tillfälle, mg	Antal administrerings-tillfällen/dygn	Doser/cykel	Adm
A	Osimeritinib	80 mg (standarddos)	1	Kontinuerlig behandling	p.o.

Tablettstyrkor: 40 och 80 mg.

### Inför start

- Mutationsstatus EGFR i tumör- eller plasmaprover ska vara fastställd
- Kontroll av blod- lever och elektrolytstatus inkl. kreatinin
- EKG
- Värdering av risk/nytta för patienter med hjärtproblematik, se FASS

### Administrering

- Om tablett inte kan sväljas, kan den först lösas upp i 0,5 dl vanligt vatten, drick omedelbart och drick lite extra vatten efteråt. Vid ventrikelsond används totalt ca 30 ml vatten som administreras inom 30 minuter.
- Tas med eller utan föda vid ungefär samma tidpunkt varje dag.
- Om en dos missats ska den endast tas om det är mer än 12 timmar kvar till nästa planerade dos.
- Undvik samtidigt intag av johannesört då det kan påverka effekten av osimeritinib.

### Uppföljning

- Provtagning med blod- lever och elektrolytstatus inkl. kreatinin efter 1, 2, 4, 8 och 12 veckor därefter var tredje månad.
- Telefonuppföljning av ssk efter 2 veckor, observans på lungbesvär
- Toxkontroll hos läkare efter 4 veckor, EKG vid 1:a utvärderande läkarbesöket, därefter vid behov.

### Biverkningar

- Hematologisk toxicitet
- Hudtoxicitet
- Diarré, illamående, nedsatt aptit
- Stomatit
- Interstitiell lungsjukdom
- Hjärttoxicitet
- Förlängning av QTc-intervall

**Dosreduktion**

Vid svårare biverkningar (grad 3-4) görs behandlingsuppehåll till förbättring. Därefter återgång till 80 mg eller dossänkning till 40 mg eller utsättning av läkemedlet, se FASS.

[Patientinformation](#)**Körschema**

	Att göra
1	Skriv recept + säkerställ att patienten vet hur han/hon skall ta tablettarna.