

Lung Ceritinib (Zykadia)

Kontinuerlig behandling

Indikation

Behandling av vuxna patienter med ALK-positiv avancerad icke småcellig lungcancer (NSCLC) som tidigare behandlats med Xalkori.

Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings-tillfälle, mg	Antal administrerings-tillfällen/dygn	Doser/cykel	Adm
A	Ceritinib (Zykadia)	750 mg	1	Kontinuerlig behandling	p.o.

Kapselstyrkor: 150 mg

Administrering

- Kapslarna ska sväljas hela med vatten, UTAN mat. Mat får inte intas 2 timmar innan eller 2 timmar efter intag av kapsel. Får inte tuggas eller krossas.
- Tips att ta kapseln till natten för att det då är lättare att undvika mat och att vissa GI-biverkningar kan minska något.
- Vid glömd dos ska kapslarna tas så fort som möjligt, hoppa över om <12 timmar till nästa dos.
- Undvik samtidigt intag av grapefruk eller grapefruktjuice (ökad plasmakoncentrationer av Zykadia).

Biverkningar

Informera om allvarliga biverkningar:

- Leverpåverkan
- EKG med QT-förlängning och/eller bradykardi som kan ge ostadighet/yrsel, obehagskänslor i bröstet, oregelbunden puls??
- Intestinell lungsjukdom allvarlig biverkan men ovanlig. Om patienten får problem med hosta, feber, andningssvårigheter och bröstsmärta bör de kontakta sjukvården.

Informera om vanliga biverkningar:

- Uppkördhet såsom diarré, illamående, kräkningar och förstoppning.
- Synrubbingar såsom nedsatt syn, dimsyn och ackommodationsproblem. Iaktta försiktighet vid framförande av fordon eller användningen av maskiner!

Övrigt

- Recept: Loperamid ____? ____
- Behandling fortsätter till tumörprogress.

Patientinformation

Körschema

Att göra	
1	Skriv recept + säkerställ att patienten vet hur han/hon skall ta kapslarna. Informera om att varan kan ta tid att beställa hem från lokalt apotek.

Uppföljning

- Med avseende på biverkningar som t.ex. magtarmbiverkningar, leverpåverkan via telefon med sjuksköterska, inom 1 vecka efter behandlingsstart (diarré kan starta cirka 6 dagar, illamående efter 9 dagar).
- Leverstatus (ASAT, ALAT och totalbilirubin) ska tas vecka 0, 2, 4, 8 osv. Fastglukos i plasma ska tas vecka 0, 4 och därefter med jämna mellanrum. Blodtryck och hjärtfrekvens ska kontrolleras regelbundet. EKG och elektrolyter ska mätas hos patienter med QTc-förlängning, befintlig hjärtsjukdom, bradykardi och elektrolytrubbning.
 - Hos läkare inledningsvis efter 3v? 4v? med lungröntgen, EKG, labprover samt klinisk bedömning