

Bröst Docetaxel 75 dostät 14 d

Cytodose= "Bröst Docetaxel 75 dostät" Kurintervall 14 dagar

Indikation: Bröstcancer, adjuvant/neoadjuvant. Fyra kurer ges efter behandling med Epirubicin och Cyklofosamid.

Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings-tillfälle, mg/m ²	Antal administrerings-tillfällen/dygn	Doser/cykel/kur	Adm	Dag
A	Docetaxel (Taxotere)	75	1	1	i.v.	1
B	Pegfilgrastim	6 mg	1	1	s.c.	2

	Substans/dag	1	Dag 2-14 behandlingsuppehåll	Dag 15 ny cykel/kur
A	Docetaxel	A	-	
B	Pegfilgrastim		Ges dag 2	

Övrigt

- Allergiprofylax: Premedicinering med kortison motsvarande tablett Betametason: 1 tim före behandling tas Betapred 16 tabletter = 8 mg. Dagen efter behandling; på morgonen tas Betapred 8 tabletter = 4 mg.
- [Antiemetika vid behov](#)
- G-CSF ingår i regimen. Ordineras i Cosmic. Delas ut av sjuksköterska, ej på recept.
- [Provtagning, rutinmässig](#)

Dosreduktion

Substans	Neutrofila	TPK
	< 1,0	<100
Docetaxel	Behandlingen uppskjutes	Behandlingen uppskjutes

Patientinformation

[Allergiprofylax](#)

Körschema

Att göra	Infusionstid	Var ordinerat

1.	Kontrollera att patienten tagit allergiprofylax, se under övrigt.		Recept ges till patienten
2	Akutvagn tillgänglig		-
3	Sätt spoldropp 250 ml Natriumklorid för spolning före och efter Docetaxel		
4	Ge Docetaxel spädd i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml som intravenös infusion	60 minuter	Cytodos
5	Lämna ut pegfilgrastim enligt ordination		Cosmic