

## Lung Sotorasib (Lummykras)

Kontinuerlig behandling. Proteinkinashämmare

### Indikation

avancerad icke-småcellig lungcancer med KRAS G12C-mutation och som har utvecklats efter minst en tidigare linje av systemisk terapi.

### Behandling

Substans (preparat)	Dos/administrerings-tillfälle, mg	Antal administrerings-tillfällen/dygn	Doser/cykel	Adm
A Sotorasib (Lummykras)	960 mg (standarddos) = 8 tabletter à 120 mg	1	Kontinuerlig behandling	p.o.

### Övrigt

- [Interaktionsbenägen substans](#)
- Johannesört ska inte intas under behandlingen
- Interstitiell lungsjukdom/pneumonit finns rapporterat
- Provtagning  
Kontroll av blod- lever och elektrolytstatus inkl. kreatinin Övervaka leverfunktionstester (ALP, ASAT och totalt bilirubin) före start och var tredje vecka under de första tre månaderna  
Provtagning med blod- lever och elektrolytstatus inkl. kreatinin efter 1,2, 4, 8 och 12 veckor därefter var tredje månad.
- Biverkningar: diarré, levertoxicitet och hosta, muskuloskeletal smärta, illamående, trötthet
- Tas med eller utan föda vid ungefär samma tidpunkt varje dag.
- Om det har gått mindre än 6 timmar sedan den schemalagda doseringen, ska patienten ta dosen som vanligt. Om det har gått mer än 6 timmar sedan den schemalagda doseringen, ska patienten inte ta dosen. Behandlingen ska fortsätta enligt ordination nästa dag.

### Dosreduktion

Dosreduktionsnivå	Dos
Startdos	960 mg (8 tabl a 120 mg)
Första dosreduktion	480 mg (4 tabl a 120 mg)
Andra dosreduktion	240 mg (2 tabl a 120 mg)

### Patientinformation

#### Körschema

Att göra
1 Skriv recept + säkerställ att patienten vet hur hen skall ta tablettorna.

### Övrigt

Telefonuppföljning av ssk efter 2 veckor, observans på lungbesvär