

## Bröst Karboplatin AUC 5 – NabPaclitaxel 100 21 d

Cytodose: "Bröst Karboplatin-Nab-paclitaxel 21 d dag 1/8/15" Kurintervall: 21 dagar

Indikation: Bröstcancer

### Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings-tillfälle, mg/m <sup>2</sup>	Antal administrerings-tillfällen/dygn	Doser/cykel/kur	Adm	Dag
A	NabPaclitaxel	100	1	2	i.v.	1,8,15
B	Karboplatin	AUC=5*	1	1	i.v.	1

\* Calverts formel Dos (mg)=(planerad AUC) x (GFR ml/min + 25).

	Substans/dag	1	8	15	Dag 22 ny cykel/kur
A	NabPaclitaxel	A	A	A	
B	Karboplatin	B	-	-	

### Övrigt

- Antiemetika dag 1 högemetogen (Akynzeo delas ut av sjuksköterska, ej på recept)  
Dag 8 + 15 lågemetogen
- Iohexolclearance. Använd det okorrigerade värdet=absolut för dosering av karboplatin
- G-CSF utifrån individuell bedömning.
- Monitorera perifer neuropati, hudtoxicitet och mukosit/diarréer. Se FASS för specifika råd om dosreduktioner/uppehåll vid grad 2-4 toxicitet.
- [Rutinmässig provtagning Bröst](#)

### Dosreduktion icke-hematologisk toxicitet enligt NCIC -gradering

Substans	1:a gången	2:a gången	3:e gången	4:e gången
Grad I	Fortsätt behandlingen	Fortsätt behandlingen	Fortsätt behandlingen	Fortsätt behandlingen
Grad II	Återuppta (fulldos) vid tox 0-1	Återuppta (75 % av fulldos) vid tox 0-1	Återuppta (50 % av fulldos) vid tox 0-1	Avsluta behandlingen
Grad III	Återuppta (75 % av fulldos) vid tox 0-1	Återuppta (50 % av fulldos) vid tox 0-1	Avsluta behandlingen	

Grad IV	Avsluta behandlingen			
---------	----------------------	--	--	--

### Dosreduktion hematologi

Substans	Neutrofila	Neutrofila	TPK	TPK
	≥1,0	<1,0	≥ 100	<100
Karboplatin	100 %	Behandlingen uppskjutes	100 %	Behandlingen uppskjutes
NabPaclitaxel	100 %	Behandlingen uppskjutes	100 %	Behandlingen uppskjutes

[Patientinformation NabPaclitaxel \(fel diagnos\)](#)

[Patientinformation: Karboplatin](#)

### Körschema dag 1

	Att göra	Infusionstid	Var ordinerat
1	Kontrollera att patienten tagit antiemetika		Cytodose
2	Sätt spoldropp 250 ml Natriumklorid för spolning före och efter		
3	Ge NabPaclitaxel. NabPaclitaxel späds i Natriumklorid 9 mg/ml, beroende på NabPaclitaxeldos varierar volymen i påsen. Apoteket tillsätter aktuell volym till en tom steril påse, och skriver på etiketten hur många ml som påsen innehåller. Starta Nab-Paclitaxelinfusionen och spola snabbt in max 20 ml, detta för att fylla aggregatet med verksam substans.	20 minuter Därefter 20 ml NaCl på 10 minuter	Cytodose
4	Ge Karboplatin spädd i 500 ml Glukos 50 mg/ml intravenöst	30 min	Cytodose

### Körschema dag 8+15

	Att göra	Infusionstid	Var ordinerat
1	Sätt spoldropp 250 ml Natriumklorid för spolning före och efter		
2	Ge NabPaclitaxel. NabPaclitaxel späds i Natriumklorid 9 mg/ml, beroende på NabPaclitaxeldos varierar volymen i påsen. Apoteket tillsätter aktuell volym till en tom steril påse, och skriver på etiketten hur många ml som påsen innehåller. Starta Nab-Paclitaxelinfusionen och spola snabbt in max 20 ml, detta för att fylla aggregatet med verksam substans.	20 minuter Därefter 20 ml NaCl på 10 minuter	Cytodose

