

Lung Topotekan p.o. 21 d

Kurintervall: 21 dagar

Indikation: Småcellig lungcancer. Second line.

Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings-tillfälle, mg/m ²	Antal administrerings-tillfällen/dygn	Doser/cykel	Adm	Dag
A	Topotekan (Hycamtin)	2,3	1	5	p.o.	1, 2, 3, 4, 5

	Substans/dag	1	2	3	4	5	Dag 6-21 behandlingsuppehåll	Dag 22 ny cykel
A	Topotekan (Hycamtin)	A	A	A	A	A	-	

Övrigt

- Medeleemetogen antiemetika: Betapred 3 mg p.o., Ondansetron 8 mg p.o. dag 1-5
- Antal cykler = 4.
- Skrivs ej på recept. Sjuksköterskan delar och ger patienten. Kapslar finns på 1 mg samt på 0,25 mg.
- [Provtagning](#)

Dosreduktion - hematologi

Substans	Neutrofila	TPK
	< 1,5	< 100
Topotekan	Behandlingen skjuts upp en vecka.	Behandlingen skjuts upp en vecka.

[Patientinformation](#)

Antiemetika följer med medicinlistan i ELAS

Körschema dag 1-5

Att göra:	Infusionstid	Var ordinerat
Dela kapslarna i påsar (eller särskild dosett) samt säkerställ att patienten förstått hur de skall tas		Cytodose