

## Lung Irinotekan – Karboplatin 21 d

Cytodose: "Lung Irinotekan-Karboplatin 21 d."

Kurintervall: 21 dagar

Indikation: Småcellig lungcancer, spridd sjukdom.

### Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings- tillfälle, mg/m <sup>2</sup>	Antal administrerings- tillfällen/dygn	Doser/cykel	Adm	Dag
A	Irinotekan	175	1	1	i.v.	1
B	Karboplatin	AUC=5*	1	1	i.v.	1

\*Calverts formel Dos (mg)=(planerad AUC) x (GFR ml/min + 25).

	Substans/dag	1	Paus dag 2-21	Dag 22 ny cykel
A	Irinotekan	A	-	
B	Karboplatin	B	-	

### Övrigt

- Kontraindikation: Inflammatorisk tarmsjukdom.
- [Antiemetika -Högemetogen](#)
- Iohexolclearance. I BOS ligger det korrigerade värdet. Använd det okorrigerade värdet (dvs. ta hänsyn till patientens längd och vikt) för dosering av karboplatin.
- Antal cykler: 4.
- Irinotekan kan orsaka akut kolinergt syndrom. Ge Atropin s.c. injektion 0,5 mg/ml 0,5 ml (dvs. 0,25 mg) förebyggande 30 minuter före Irinotekan. Om symtom på kolinergt syndrom ändå uppstår, ge s.c. injektion Atropin 0,5 mg/ml 0,5 ml (dvs. 0,25 mg).
- Var särskilt observant vid diarréer och feber. Kan kräva inläggning.
- Enligt det regionala vårdprogrammet Syd-Östra 2007-10-16 "Vid PS 3-4 och eller ålder > 70 år dosreducera primärt till 70–80 % av fulldos av samtliga cytostatika".
- [Provtagning](#)

### Dosreduktion hematologi dag 1

Substans	Neutrofila	TPK
	< 1,5	< 100
Båda preparaten	Behandlingsuppehåll i en vecka.	Behandlingsuppehåll i en vecka.

**Patientinformation**

[Patientinformation Karboplatin-Irinotekan](#)

- [Antiemetikaschema Högemetogen -](#)

**Körschema**

	Att göra	Infusionstid	Var ordinerat
1	Ge s.c. injektion av Atropin, cirka 30 min före Irinotekan		Cytodose
2	Sätt spoldropp 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml		-
3	Kontrollera att patienten tagit ordinerad antiemetika		Cosmic
4	Ge Irinotekan spädd i 250 Natriumklorid 9 mg/ml som intravenös infusion	1 timme	Cytodose
5	Ge Karboplatin spädd i 500 ml Glukos 50 mg/ml som intravenös infusion	30 minuter	Cytodose