

NE Everolimus (Afinitor)

Cytodose= ej ännu aktuellt Kurintervall: Kontinuerlig

Indikation

NET: Inoperabel eller metastaserande, väl eller måttligt differentierade, neuroendokrina tumörer

Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings- tillfälle, fast dos	Antal administrerings- tillfällen/dygn	Doser/cykel	Adm	Dag
A	Everolimus(Afinitor)	10 mg (fast dos)	1	kontinuerligt	po	Alla

Övrigt

- Dosreduktion bör göras från start vid *bröstcancer*. Inled behandling med 5 mg. Elektroniskt recept på 30 tabletter. Telefonuppföljning till läkare efter 1 månad för ställningstagande för dosökning till 10 mg. Ett alternativ är att starta med 10 mg varannan dag
- Initial dos vid *njurcancer* bestäms utifrån individuell biverkningsrisk.
- Prover.

Inför start: Blodstatus + neutrofila, leverstatus, krea, lipidstatus, f-glukos, CRP. Därefter 1 gång per månad. Omkontroll av Blodstatus+neutrofila efter 2 veckor från behandlingsstart.

Vid behandling med Afinitor ska man inte ta något levande vaccin. (influensavaccin via näsan, gula febern, tyfus) OK att ge vaccin mot influensa samt stelkramp.

- Telefonkontakt med sjuksköterska efter 1 vecka (toxkontroll) respektive 2 veckor (kontroll av prover). Lathund: [Everolimus \(Afinitor\) - biverkningar gradering](#)
- Sjuksköterska kontrollerar prover och kontaktar läkare vid avvikande provsvar (rödmarkerat i BoS eller enligt journaltext). Patienten får ingen bekräftelse på proverna så länge de är normala. Vid minsta tveksamhet ska sjuksköterska kontakta läkare; 1. PAL, 2. Cytordinatör, 3 Dagjour.
- Sjuksköterska ska skriva remiss till käkkirurgen inför uppstart av behandling.
- Afinitor fördröjer sårhäkning, varför kontakt med läkare ska tas vid operationer eller tandläkaringrepp.
- Nasonex kan användas som spray för munhålan i stället för kortisonlösning
- Läkare/ sjuksköterska skriver remiss till vårdcentral för kontroll av blodtryck, initialt varje vecka i 1 månad, sedan utglesning till varannan vecka och därefter individuellt

Dosreduktion

[Everolimus \(Afinitor\) - biverkningar gradering](#)

- Biverkan grad 1 behövs oftast ingen dosjustering
- Biverkan grad 2-4 :[Dosreduktion vid biverkningar](#) (FASS)

Patientinformation

- Patientinformation: Broschyr (finns på onkologmottagningen) samt utskriftsvänlig information: [Afinitor-patientinfo](#)
- Nasonex kan användas som spray för munhålan i stället för kortisonlösning
- Vanliga biverkningar är: mukosit, hudutslag, hyperglykemi samt hyperlipidemi
- Risk för pneumonit som kan kräva kortisonbehandling. Uppmana patienten att höra av sig vid feber, hosta.
- Beakta nutritionssvårigheter pga oral smärta.

Körschema:

	Att göra	Var ordinerat
1	Patienten får recept. Ge patientinformation.	Cosmic